

令和3年 畑作・野菜病害虫発生情報 第16号

作物名：ねぎ（7月中旬）

7月12日～14日に実施した巡回調査の結果をお知らせします。
県内全域でさび病の発生が多い状況です。

1 ベと病（発生量：津軽地域…少ない 県南地域…平年並）

津軽地域では発生が確認されなかった。県南地域では発生地点率、発病株率ともに平年並であったが、一部で甚・多発生ほ場が認められた。

なお、防除対策等は、7月16日発表の令和3年病害虫防除指導情報第7号を参照のこと。

表1 巡回調査におけるべと病の発生状況

調査時期	地域	年次	調査 地点数	発生程度別地点率（％）				発生 地点率 （％）	平均 発病株率 （％）
				甚	多	中	少		
7月中旬	津軽	本年	24	0	0	0	0	0	0
		前年	10	0	0	0	0	0	0
		平年	11	0	0	0.9	8.2	9.1	0.6
	県南	本年	36	8.3	2.8	0	41.7	52.8	8.7
		前年	21	9.5	0	4.8	28.6	42.9	9.2
		平年	22	5.0	5.3	8.3	34.5	53.2	9.8
	県計	本年	60	5.0	1.7	0	25.0	31.7	5.2
		前年	31	6.5	0	3.2	19.4	29.0	6.2
		平年	33	3.3	3.5	5.4	25.4	37.6	6.6

注）発生程度：発病株率 甚 51％以上、多 31～50％、中 11～30％、少 1～10％

2 さび病（発生量：多い）

津軽地域の発生地点率、発病株率、発病度はいずれも平年より高かった。

県南地域では発生地点率が平年並であったものの、発病株率、発病度は平年より高く、一部で甚・多発生ほ場が認められた。

なお、防除対策等は、7月16日発表の令和3年病害虫防除指導情報第7号を参照のこと。

表2 巡回調査におけるさび病の発生状況

調査時期	地域	年次	調査 地点数	発生程度別地点率（％）				発生 地点率 （％）	平均	
				甚	多	中	少		発病株率 （％）	発病度
7月中旬	津軽	本年	24	0	0	25.0	62.5	87.5	16.8	3.5
		前年	10	0	0	20.0	60.0	80.0	11.5	2.5
		平年	11	0	2.8	8.1	38.1	49.0	7.5	2.1
	県南	本年	36	5.6	16.7	2.8	41.7	66.7	20.6	8.1
		前年	21	0	4.8	9.5	71.4	85.7	16.3	3.6
		平年	22	0	3.2	15.3	47.4	66.0	11.9	3.3
	県計	本年	60	3.3	10.0	11.7	50.0	75.0	19.1	6.3
		前年	31	0	3.2	12.9	67.7	83.9	14.7	3.3
		平年	33	0	3.0	13.0	44.1	60.1	10.4	2.9

注）発生程度：発病度 甚 41以上、多 21～40、中 6～20、少 1～5

3 斑点性病害：黒斑病・葉枯病（発生量：平年並）

津軽地域、県南地域ともに発生地点率、発病株率、発病度はいずれも平年並であった。

なお、県南地域の一部では、べと病と併発した多・中発生ほ場が確認されている。

表3 巡回調査における斑点性病害の発生状況

調査時期	地域	年次	調査 地点数	発生程度別地点率（％）				発生 地点率 （％）	平均	
				甚	多	中	少		発病株率 （％）	発病度
7月中旬	津軽	本年	24	0	0	0	33.3	33.3	2.7	0.7
		前年	10	0	0	0	60.0	60.0	1.2	0.3
		平年	11	0	0	0	28.5	28.5	1.1	0.3
	県南	本年	36	0	2.8	2.8	55.6	61.1	6.9	2.7
		前年	21	0	0	4.8	61.9	66.7	9.0	2.5
		平年	22	0	0	0.5	60.1	60.5	6.1	1.6
	県計	本年	60	0	1.7	1.7	46.7	50.0	5.2	1.9
		前年	31	0	0	3.2	61.3	64.5	6.5	1.8
		平年	33	0	0	0.3	49.1	49.4	4.4	1.1

注）発生程度：発病度 甚 61以上、多 41～60、中 21～40、少 1～20

4 ネギコガ（幼虫発生量：平年並）

津軽地域の発生地点率、被害株率、被害葉率はいずれも平年並であった。

県南地域では発生地点率が平年よりやや低く、被害株率、被害葉率は平年並であった。

表4 巡回調査におけるネギコガの発生状況

調査時期	地域	年次	調査 地点数	発生程度別地点率（％）				発生 地点率 （％）	平均	
				甚	多	中	少		被害株率 （％）	被害葉率 （％）
7月中旬	津軽	本年	24	0	0	0	54.2	54.2	3.4	1.1
		前年	10	0	0	0	20.0	20.0	0.4	0.1
		平年	11	0	0	0	49.5	49.5	4.0	1.6
	県南	本年	36	0	0	0	19.4	19.4	1.9	0.6
		前年	21	0	0	0	52.4	52.4	1.9	0.6
		平年	22	0	0	0	38.3	38.3	2.0	0.7
	県計	本年	60	0	0	0	33.3	33.3	2.5	0.8
		前年	31	0	0	0	41.9	41.9	1.4	0.5
		平年	33	0	0	0	42.2	42.2	2.8	1.0

注）発生程度：被害葉率 甚 76以上、多 51～75、中 26～50、少 1～25

5 ネギハモグリバエ（発生量：津軽地域…やや多い、県南地域…やや少ない）

津軽地域の発生地点率、被害株率、被害度はいずれも平年よりやや高く、県南地域ではいずれも平年よりやや低かった。

表5 巡回調査におけるネギハモグリバエの発生状況

調査時期	地域	年次	調査 地点数	発生程度別地点率（％）				発生 地点率 （％）	平均	
				甚	多	中	少		被害株率 （％）	被害度
7月中旬	津軽	本年	24	0	0	0	66.7	66.7	6.8	1.4
		前年	10	0	0	0	50.0	50.0	0.7	0.1
		平年	11	0	1.0	0	28.1	29.1	2.1	0.5
	県南	本年	36	0	0	2.8	19.4	22.2	3.5	0.8
		前年	21	0	0	0	52.4	52.4	2.4	0.5
		平年	22	0	0.9	1.3	43.6	45.8	5.6	1.3
	県計	本年	60	0	0	1.7	38.3	40.0	4.8	1.0
		前年	31	0	0	0	51.6	51.6	1.8	0.4
		平年	33	0	0.9	0.9	37.6	39.4	4.3	1.0

注）発生程度：被害度 甚 31以上、多 21～30、中 11～20、少 1～10

6 ネギアザミウマ（発生量：少ない）

津軽地域の発生地点率は平年並で、被害株率、被害度は平年より低かった。

県南地域では発生地点率、被害株率、被害度のいずれも平年より低かった。

表6 巡回調査におけるネギアザミウマの発生状況

調査時期	地域	年次	調査 地点数	発生程度別地点率（％）				発生 地点率 （％）	平均	
				甚	多	中	少		被害株率 （％）	被害度
7月中旬	津軽	本年	24	0	0	4.2	66.7	70.8	11.5	2.6
		前年	10	0	0	0	90.0	90.0	8.7	1.7
		平年	11	0.9	3.4	10.6	49.7	64.6	18.4	4.3
	県南	本年	36	0	2.8	2.8	13.9	19.4	6.1	1.3
		前年	21	0	0	4.8	42.9	47.6	7.0	1.4
		平年	22	2.6	3.9	8.6	39.5	54.7	16.5	4.3
	県計	本年	60	0	1.7	3.3	35.0	40.0	8.2	1.8
		前年	31	0	0	3.2	58.1	61.3	7.5	1.5
		平年	33	2.0	3.8	9.4	42.6	57.8	17.1	4.3

注）発生程度：被害度 甚 31以上、多 21～30、中 11～20、少 1～10

県民の皆さまへのお願い
新型コロナウイルス感染拡大防止



<https://www.pref.aomori.lg.jp/koho/covid19kakudaiboushi.html>

【この情報に関する問合せ先】

青森県病害虫防除所

担当：主幹 品川 聖也

〒030-0113 青森市第二間屋町 4-11-6

TEL:017-729-1717 FAX:017-729-1900