

## 令和4年 畑作・野菜 病害虫発生情報 第8号

作物名：ねぎ（6月中旬）

さび病の初発、ネギアザミウマの食害が確認されました。  
ほ場をよく観察し、初期防除の徹底を図りましょう。

### 1. さび病（発生量 津軽地域=平年並 県南地域=少ない）

津軽地域の3ほ場で病斑を確認した。発生地点率は平年より高かったが、発病株率及び発病度は平年並であった。県南地域では確認されなかった。

巡回調査におけるさび病の発生状況

調査時期	地域	年次	調査地点数	発生程度別地点率 (%)				発生地点率 (%)	平均	
				甚	多	中	少		発病株率 (%)	発病度
6月中旬	津軽	本年	10	0	0	0	30.0	30.0	0.7	0.1
		前年	18	0	0	0	5.6	5.6	0.1	0.0
		平年	11	0	0	0	19.0	19.0	0.8	0.2
	県南	本年	8	0	0	0	0	0	0	0
		前年	22	0	0	0	4.5	4.5	0.1	0.0
		平年	20	0	0	0.8	20.2	21.1	1.7	0.4
	県計	本年	18	0	0	0	16.7	16.7	0.5	0.1
		前年	40	0	0	0	5.0	5.0	0.1	0.0
		平年	31	0	0	0.6	19.3	19.9	1.3	0.3

注) 発生程度：甚 発病度41以上、多 同21~40、中 同6~20、少 同1~6。

### 2. ネギアザミウマ（発生量 少ない）

津軽地域の1ほ場でわずかに食害を確認したのみで、県南地域では確認されなかった。

巡回調査におけるネギアザミウマの発生状況

調査時期	地域	年次	調査地点数	発生程度別地点率 (%)				発生地点率 (%)	平均	
				甚	多	中	少		食害株率 (%)	食害度
6月中旬	津軽	本年	10	0	0	0	10.0	10.0	0.1	0.0
		前年	18	0	0	0	22.2	22.2	3.6	0.7
		平年	11	0	0	2.0	49.0	51.0	6.6	1.3
	県南	本年	8	0	0	0	0	0	0	0
		前年	22	0	0	0	4.5	4.5	0.0	0.0
		平年	20	0	0	3.4	45.4	48.8	6.6	1.4
	県計	本年	18	0	0	0	5.6	5.6	0.0	0.0
		前年	40	0	0	0	12.5	12.5	1.7	0.3
		平年	31	0	0	2.9	46.9	49.8	6.6	1.4

注) 発生程度：甚 発病度31以上、多 同21~30、中 同11~20、少 同1~10。

### 3. そのほかの病害虫

べと病の発生、ネギハモグリバエやネギコガの食害は確認されなかった。

県民の皆さまへのお願い  
新型コロナウイルス感染拡大防止



<https://www.pref.aomori.lg.jp/koho/covid19kakudaiboushi.html>

#### 《この情報に関する問い合わせ先》

青森県病害虫防除所 〒030-0113 青森市第二問屋町4-11-6  
TEL:017-729-1717 FAX:017-729-1900  
担当：主幹専門員 及川 健