

令和4年 果樹病害虫発生情報 第7号

作物名：ぶどう（6月下旬）

6月下旬に実施した巡回調査（津軽地域6か所、県南地域6か所）の結果についてお知らせします。

1 灰色かび病（花穂の発病）

津軽地域、県南地域ともに発生は確認されなかった。

巡回調査における灰色かび病の発生状況

（品種：津軽 スチューベン、県南 キャンベル・アーリー）

| 地域 | 年次 | 調査園地数 | 発生程度別園地率（%） | | | | | 発生園地率（%） | 発病花穂率（%） | 発病度 |
|----|----|-------|-------------|---|-----|-----|------|----------|----------|------|
| | | | 甚 | 多 | 中 | 少 | 無 | | | |
| 津軽 | 本年 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 前年 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 平年 | 6 | 0 | 0 | 3.3 | 6.7 | 90.0 | 10.0 | 0.95 | 0.64 |
| 県南 | 本年 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 前年 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 平年 | 6 | 0 | 0 | 2.9 | 9.1 | 88.1 | 11.9 | 0.60 | 0.34 |

注）発生程度：甚 発病花穂率51%以上、多 同31～50%、中 同11～30%、少 同10%以下
調査方法：100花穂の果梗や穂軸における発病花穂を発生程度別に調査

2 べと病（葉の発病）

津軽地域における発生は、平年と同様に確認されなかった。

巡回調査におけるべと病（葉）の発生状況（品種：スチューベン）

| 地域 | 年次 | 調査園地数 | 発生程度別園地率（%） | | | | | 発生園地率（%） | 発病葉率（%） | 発病度 |
|----|----|-------|-------------|---|---|---|-----|----------|---------|-----|
| | | | 甚 | 多 | 中 | 少 | 無 | | | |
| 津軽 | 本年 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 前年 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 平年 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

注）発生程度：甚 発病率51%以上、多 同31～50%、中 同11～30%、少 同10%以下
調査方法：新梢10本について、基部葉から連続10葉における発病葉数を発生程度別に調査

《当情報に関する問い合わせ先》

青森県病害虫防除所 〒030-0113 青森市第二問屋町4-11-6
TEL:017-729-1717 FAX:017-729-1900
mail:byogaichu@pref.aomori.lg.jp 担当:主査 齊藤景子