



決め手は、青森県産。



りんご生産情報第6号  
(6月24日～7月5日)

令和5年6月23日発表  
青森県「攻めの農林水産業」推進本部

できるだけ早く仕上げ摘果を行う！  
「7月初め」の薬剤散布は7月1～2日頃!!  
腐らん病は適切な処置を!!!

## I 概要

6月21日現在の果実肥大は、各品種とも平年を上回っている。

摘果が遅れたり、着果量が多いと、玉伸びだけでなく花芽形成などに悪影響を及ぼすので、さびなどの障害がない果実を見極めながら、品種別の標準的な着果程度を目安に、できるだけ早く仕上げ摘果を行う。

有袋栽培は、つる割れの軽減や着色の向上、収穫期の分散ができるので、積極的に取り組む。

「7月初め」の薬剤散布は、黒石、弘前、三戸で7月1～2日頃に実施する。散布むらが生じないように基準散布量を守り、降雨前の散布を徹底する。

枝腐らんは見つけ次第切り取り、胴腐らんは再発病斑を含め、適切に処置を行う。

## Ⅱ りんご生産情報

### 1 果実肥大、作業の進み、病害虫の動き

#### (1) 果実肥大

本年は、各品種とも果実肥大は平年を上回っている。

#### ○果実肥大

(6月21日現在、横径cm、平年比%)

地 域	年	つがる	ジョナゴールド	ふ じ
黒 石 (りんご研究所)	本 年	4.7	-	4.4
	平 年	3.8	-	3.5
	前 年	4.3	-	4.1
	平年比	124	-	126
青森市浪岡 (東青地域県民局)	本 年	4.4	-	3.8
	平 年	3.7	-	3.2
	前 年	4.3	-	3.8
	平年比	119	-	119
弘前市独狐 (中南地域県民局)	本 年	4.9	4.4	4.0
	平 年	3.9	3.8	3.3
	前 年	4.4	4.3	3.6
	平年比	126	116	121
板柳町五幾形 (西北地域県民局)	本 年	4.6	-	4.4
	平 年	3.9	-	3.3
	前 年	4.0	-	3.6
	平年比	118	-	133
三戸町梅内 (三八地域県民局)	本 年	4.9	4.8	4.1
	平 年	3.7	3.6	3.3
	前 年	4.6	4.3	3.7
	平年比	132	133	124

注) 各県民局のデータは農業普及振興室の生育観測ほ調査データ

#### (2) 作業等の進み (6月21日現在)

ふじの一つ成り摘果、仕上げ摘果が行われている。

徒長枝整理が行われている。

## (3) 病害虫の動き

(6月21日現在 りんご研究所)

腐らん病	摘果後の果柄感染継続中
黒星病	葉・果実とも2次感染継続中 殺菌剤無散布の県予察ほでの新梢葉発病葉率(ふじ) (本年:6月20日63.5%、平年:6月20日30.2%)
褐斑病	感染継続中
斑点落葉病	感染継続中 (葉の病斑初発、本年:6月12日、平年:6月24日) 殺菌剤無散布の県予察ほでの新梢葉発病葉率(スターキング) (本年:6月20日2.7%、平年:6月20日0.1%)
リンゴハダニ	卵～成虫が混在。幼虫～成虫が葉を加害中
ナミハダニ	卵～成虫が混在。幼虫～成虫が葉を加害中
リンゴコカクモンハマキ	越冬世代成虫の羽化継続中 (成虫初発 本年:6月2日、平年:6月4日)
モモシンクイガ	越冬世代成虫の羽化及び産卵継続中 (産卵初発 本年:6月10日、平年:6月9日)
ナシヒメシンクイ	第1世代成虫の羽化継続中 (第1世代成虫誘引初発 本年:6月17日、平年:6月20日)
キンモンホソガ	第1世代成虫の羽化盛期 (第1世代羽化50% 本年:6月15日、平年:6月18日)

## 2 作業の重点

## (1) 摘果

摘果が遅れたり、着果量が多いと、玉伸びだけでなく花芽形成などに悪影響を及ぼすので、さびなどの障害がない果実を見極めながら、品種別の標準的な着果程度を目安に、できるだけ早く仕上げ摘果を行う。

仕上げ摘果を終了した園地でも、随時着果量を点検し、見直し摘果により小玉果やさび果、変形果などを摘み取る。

品種別の標準的な着果程度

品 種	摘果の強さ (残す果実)	着果率 (%)
紅玉	3頂芽に1果	33
つがる、ジョナゴールド	3.5頂芽に1果	29
ふじ、王林、早生ふじ、トキ、シナノゴールド、 きおう、金星、シナノスイート、未希ライフ、 ぐんま名月、星の金貨、千雪、夏緑、恋空、祝、花祝	4頂芽に1果	25
北斗	4.5頂芽に1果	22
陸奥・世界一	5頂芽に1果	20

(2) 袋かけ

ふじは有袋にすることで、つる割れの軽減や着色の向上、収穫期の分散ができるほか、販売戦略上も重要なため、有袋栽培に積極的に取り組む。

袋かけは7月10日頃までに終えるようにする。

(3) 「7月初め」の薬剤散布

「7月初め」の薬剤散布は、黒石、弘前、三戸で7月1～2日頃に実施する。

「7月初め」から「8月末」までの薬剤散布は、15日間隔で行う。散布むらが生じないよう基準散布量を守り、降雨前の散布を徹底する。

「7月初め」の殺虫剤はピレスロイド剤を使用する。

前年にシンクイムシ類の被害がなく、周辺に放任園など発生源の見られない園地では、次回の「7月半ば」のシンクイムシ類防除剤を省略できる。

「7月初め」

地域	散布時期	基準薬剤	散布量/10 a
黒石 弘前 三戸	7月1～2日頃	ピレスロイド剤 ( バイスロイドEW 2,000倍 サイハロン水和剤 2,000倍 アーデントフロアブル 2,000倍 イカズチWDG 1,500倍 ) ----- アントラコール顆粒水和剤 500倍 又はパスポート顆粒水和剤 1,000倍 又はチウラム剤 500倍 ( チオノックフロアブル トレノックスフロアブル ) 又はオキシラン水和剤 500倍 又は有機銅剤 ( キノンドー顆粒水和剤 1,000倍 オキシンドー水和剤80 1,200倍 )	5000

炭疽病の発生が例年多い園地や高温多湿条件が続いて多発が懸念される場合は、パスポート顆粒水和剤、オキシラン水和剤、有機銅剤のいずれかを選択する。

輪紋病のいぼ皮病斑が多発している園地では、オキシラン水和剤、有機銅剤のいずれかを選択する。

#### (4) 有袋栽培におけるすす斑病対策

袋かけ前の薬剤散布が特に重要なので、散布間隔をあげ過ぎないようにし、果実にも薬液が十分付着するようにする。薬剤散布後5日以内を目安に袋かけを行い、その後も袋かけを継続する場合は、次の定期散布までの間に、有効な薬剤による特別散布（実洗い）をしてから行う。

#### (5) 腐らん病対策

腐らん病は感染してから1～2年後に発病するため、適切な対策を速やかに講じることが重要である。

枝腐らんは、見つけ次第切り取り、適切に処分する。

摘果後のつる（果柄）から侵入・感染するので、果台につるが残らないようにする。

胴腐らんは、処置が不十分であったり、誤った処置が行われている園地もみられるので、再発病斑を含め、削り取り法か泥巻き法のいずれかの処置を適切に行う。胴腐らんの発病が著しい樹は、伝染源になるので積極的に伐採し、速やかに園外へ搬出する。

#### (6) 黒星病対策

一部園地で発生が見られていることから、自園地の状況を確認し、被害葉、被害果は見つけ次第摘み取り、適切に処分する。

(7) シンクイムシ類対策

被害果は見つけ次第摘み取り、適切に処分する。

もも、なし、日本すもも、プルーン、マルメロなども発生源になるので、適切な管理を行う。

(8) ハダニ類対策

発生動向を見極めながら適正な防除を行う。散布の目安は1葉当たり2個体以上あるいは寄生葉率50%以上である。殺ダニ剤は薬剤抵抗性が出やすいので、年2回以内使用のものでも年1回の使用とする。

ダニサラバフロアブル、スターマイトフロアブル、ダニコングフロアブルは合わせて年1回の使用とする。

ダニオーテフロアブルは銅剤（有機銅剤及びオキシラン水和剤）と混用しない。銅剤を散布した後は使用しない。また、散布後に銅剤を使用する場合は10日以上散布間隔をあける。

リンゴハダニとナミハダニに対する殺ダニ剤の適用表


薬剤名	倍数	使用時期	年間使用回数	リンゴハダニ	ナミハダニ
サンマイト水和剤	1,500倍	収穫21日前	1回	○	×
バロックフロアブル	2,000倍	14日	2回以内	○	×
エコマイト顆粒水和剤	2,000倍	7日	1回	○	○
コロマイト乳剤	1,000倍	前日	1回	○	○
マイトコーネフロアブル	1,000倍	前日	1回	×	○
ダニサラバフロアブル	1,000倍	前日	2回	○	×
スターマイトフロアブル	2,000倍	前日	1回	○	×
ダニコングフロアブル	2,000倍	前日	1回	○	×
ダニオーテフロアブル	2,000倍	前日	1回	○	○

注1) ○：効果が高い、×：効果が低い

2) コロマイトは6月下旬までの使用を避ける

(9) クワコナカイガラムシ対策

発生が多い園地では、バンド巻きによる誘殺を6月下旬（成虫の産卵前）に行い、7月中旬（卵のふ化前）に除去する。



バンド巻きの実施方法

(10) マメコバチの巣箱の回収と管理

マメコバチの活動終了後の巣箱は7月上旬頃に回収し、小屋の軒下などにまとめて保管する。

この場合、ネズミの被害や雨水の跳ね返りを避けるため、地面からできるだけ離す。また、箱の積み重ねや雨除けにも配慮し、巣筒の内部が過湿にならないように注意する。

なお、巣箱回収時には、コナダニの発生状況を確認し、必要に応じて高温処理法などにより駆除するとともに、天敵などが侵入しないように不織布などで被覆する。

(11) ビターピット防止対策

例年よりも樹勢が強いとみられる場合や、幼果期（6～7月）の少雨、夏期の高温が予想される場合は、下表によりカルシウム剤を直接果実に付着するように散布する。

樹勢の弱い樹や高温時、あるいは干ばつ時には薬害発生（葉縁褐変）の恐れがあるので避ける。

カルシウム剤の散布方法

資材名	散布時期 (散布間隔)	資材形状	水1000当たり 使用量 (倍数)	散布回数 (回)
スイカル	6月上旬～9月中旬 (10日以上)	粉状	330 g (300倍)	3～5
セルバイン	6月上旬～9月上旬 (10日以上)	粉状	250 g (400倍)	3～5
アグリメイト	6月上旬～9月中旬 (15日以上)	液状	200ml (500倍)	5

3 一般作業

- (1) 追肥（6月末まで） (2) 草刈り (3) ひこばえ、徒長枝の整理  
(4) 苦土欠乏対策

4 今後の作業（7月6日～7月26日）

- (1) 摘果の見直し (2) 薬剤散布 (3) 腐らん病対策 (4) 黒星病対策  
(5) クワコナカイガラムシ対策 (6) 徒長枝整理 (7) 支柱入れ、枝吊り  
(8) 草刈り (9) ビターピット防止対策 (10) 苦土欠乏対策

青森県農薬危害防止運動展開中（6月～8月）！

《 農薬使用基準の遵守 》

農薬を使用する場合は、必ず最新の農薬登録内容を確認する。

○農林水産省「農薬登録情報提供システム」 (<https://pesticide.maff.go.jp/>)

農薬の使用にあたっては、事前に周辺住民に対し、農薬の散布日時や使用者の連絡先等を十分な時間的余裕を持って知らせる。また、農薬の飛散により、周辺作物や近隣の住宅等に被害を及ぼすことのないように農薬飛散低減対策に留意して散布する。

《 農業保険に加入し、農業経営に万全の備えを!! 》

農業保険には、果樹共済、農業経営収入保険などがあります。自分の経営にあった保険を選択、加入して、自然災害をはじめとしたリスクに備えましょう。

詳しくは、お近くの農業共済組合まで、お問い合わせください。

農作業安全を心がけましょう！

熱中症予防には、こまめな休憩と水分の補給をしっかりと行いましょう！

次回の発行は令和5年7月5日（水）の予定です。

連絡先：りんご果樹課生産振興グループ  
電話番号：017-722-1111代表  
内線5093、5094  
017-734-9492直通