

令和6年7月31日

## 水稻作況調査(生育ステージ)

(地独)青森県産業技術センター農林総合研究所

### 生育ステージ調査

品種名	穂首分化期 (月/日)				幼穂形成期 (月/日)			
	本年	平年	平年差	前年	本年	平年	平年差	前年
はれわたり	6/28	6/29	1日早	6/28	7/4	7/6	2日早	7/5
まっしぐら	6/28	7/1	3日早	6/28	7/4	7/8	4日早	7/5
青天の霹靂	6/29	7/1	2日早	6/29	7/5	7/9	4日早	7/6

品種名	葉耳間長0期 (月/日)				出穂期 (月/日)			
	本年	平年	平年差	前年	本年	平年	平年差	前年
はれわたり	7/20	7/21	1日早	7/21	7/29	7/29	±0	7/29
まっしぐら	7/17	7/21	4日早	7/18	7/28	8/1	4日早	7/28
青天の霹靂	7/20	7/23	3日早	7/21	7/30	8/2	3日早	7/30

注 1) 農林総合研究所(黒石)の作況試験のデータ。

2) 耕種概要 播種日:4月15日 移植日:5月20日(4本手植え)、栽植密度21.2株/m<sup>2</sup>

3) 平年値は、「はれわたり」が2021年以降(3か年)の平均値、「まっしぐら」が2007年~2008年および2011年以降(15か年)の平均値、「青天の霹靂」が2015年以降(9か年)の平均値。

### 【概況】

移植翌日から出穂期までの気象は、平均気温は平年より1.7℃高く、日照時間は平年比104~106%だった。出穂期は、「はれわたり」は7月29日で平年並み、「まっしぐら」は7月28日で4日早く、「青天の霹靂」は7月30日で3日早かった。

(参考) 移植翌日から出穂期までの気象 (アメダス:黒石)

「はれわたり」

区分	本年	平年	平年差・比
平均気温	20.8℃	19.1℃	+1.7℃
最高気温	25.3℃	23.7℃	+1.5℃
最低気温	16.6℃	15.1℃	+1.5℃
日照時間	423.5hr	404.1hr	105%

「まっしぐら」

区分	本年	平年	平年差・比
平均気温	20.7℃	19.0℃	+1.7℃
最高気温	25.3℃	23.7℃	+1.5℃
最低気温	16.6℃	15.1℃	+1.5℃
日照時間	423.2hr	398.5hr	106%

「青天の霹靂」

区分	本年	平年	平年差・比
平均気温	20.8℃	19.1℃	+1.7℃
最高気温	25.3℃	23.8℃	+1.5℃
最低気温	16.7℃	15.2℃	+1.5℃
日照時間	427.4hr	409.8hr	104%