

# 畑作・野菜・花き生産情報 第5号

令和7年8月20日  
青森県「農林水産力」強化本部

- ◎ 大豆では、紫斑病、マメシンクイガの防除を徹底しよう！
- ◎ 台風や大雨に備え、ほ場や施設周辺にある排水口の点検や整備のほか、施設への雨水流入を防ぐために土のうを設置するなど、排水・防水対策を徹底しよう！
- ◎ 野菜・花きでは、高温・水不足の影響が見られているので、対策を徹底しよう！
  - ・生育に応じたかん水や葉面散布等を行い、草勢を維持しよう！
  - ・病害虫の発生に注意し、早期発見・早期防除に努めよう！
  - ・施設では換気や遮光をこまめに行うなど、適正な温度管理に努めよう！

## 畑作物

### 1 大豆

#### (1) 生育状況

- ・生育は順調で、開花期は3～7日早まった。
- ・べと病や食葉性害虫による食害、倒伏が発生しているほ場が見られる。

表 大豆の生育状況（8月10日現在）

場所	年次	は種期 (月日)	出芽期 (月日)	開花期 (月日)	草丈 (cm)	主茎長 (cm)	葉数 (枚)	分枝数 (本)
農林総合研究所 (黒石市)	本年	5/28	6/6	7/20 (1日遅)	74.4 (81%)	46.1 (81%)	13.1 (-0.5)	1.7 (-1.1)
	平年	5/25	6/5	7/26	91.3	56.6	13.6	2.8
	前年	5/24	6/4	7/22	83.4	41.2	13.7	2.6
野菜研究所 (六戸町)	本年	5/26	6/4	7/20 (±0日)	96.9 (90%)	60.0 (90%)	13.3 (-0.5)	2.9 (+0.7)
	平年	5/25	6/4	7/27	107.4	66.9	13.8	2.2
	前年	-	-	-	-	-	-	-
藤崎町 (中野目)	本年	6/2	6/11	7/24 (1日早)	92.3 (104%)	-	12.8 (-0.4)	-
	平年	6/3	6/12	7/27	88.9	-	13.2	-
	前年	6/1	6/14	7/25	104.7	-	14.9	-
つがる市 (木造土瀬)	本年	5/28	6/7	7/19	103.3	-	14.4	-
	平年	-	-	-	-	-	-	-
	前年	5/26	6/7	7/22	88.7	-	12.4	-
十和田市 (赤沼)	本年	6/5	6/14	7/23 (4日遅)	111.4 (121%)	-	13.3 (±0.0)	-
	平年	6/1	6/10	7/29	92.4	-	13.3	-
	前年	6/9	6/15	7/26	97.0	-	13.4	-

注) ①品種は「おおすず」

②本年調査日は藤崎町のみ8月12日、その他は8月8日

③平年値は農林総合研究所が過去18か年、野菜研究所の平均値はR4とR5の平均値、藤崎町が過去14か年、十和田市が過去15か年の平均値。つがる市はR6から設置のため平年値無し。

## (2) 今後の留意点

- 立枯病発病株を確認したら、速やかに抜き取りを行い、ほ場外で処分する。
- 紫斑病は、開花期後20～40日の間に防除する。なお、チオファネートメチル剤、ベノミル剤、アゾキシストロビン剤に対する耐性菌が県内にも分布しているので、薬剤の選択には注意する。アゾキシストロビン剤の効力が低下していないほ場では、QoI剤 (FRACコード: 11、アミスター20フロアブル等) の使用を1作につき1回までとする。また、耐性菌の新たな発生や発生地点の拡大を回避するため、連年使用せず、2～3年に1回の使用にとどめる。
- ツメクサガ、ウコンノメイガ等の食葉性害虫の早期発見・早期防除に努める。
- カメムシ類による被害が予想される場合は、着莢期から子実肥大中期に薬剤防除を行う。
- マメンクイガの防除を次により徹底する。

散布時期	薬剤の種類
8月第6半旬～9月第1半旬に1回散布（ただし、多発生の場合は、8月第5半旬に1回目、7日後に2回目を散布）	トクチオン乳剤、パーマチオン水和剤、トレボン乳剤、トレボンMC、トレボン粉剤DL、アミスタートレボンSE、アディオン乳剤、アグロスリン乳剤、モスピランSL液剤、モスピラン顆粒水溶剤、プレバソンフロアブル5、ベネビアOD、グレーシア乳剤、トライトレボン粉剤DL、トレボンスカイMC
9月第1半旬に1回目、その後7日後に2回目を散布	エルサン乳剤、スミチオン乳剤、エルサン粉剤2、ダイアジノン粒剤5、スミトップM粉剤

注) 登録内容は令和7年8月6日現在

- 落莢を防ぐため、乾燥しているほ場では、うね間かん水を行う。
- 大雨に備え、明きよを手直しして排水溝へ接続するなどの排水対策を徹底する。

## 2 小麦（は種の準備）

- は種が早いと生育が進み過ぎて雪腐病の発生を助長し、遅いと越冬前の生育量が不足するので、は種適期である9月15～25日に確実には種できるようほ場を準備する。
- ほ場の団地化を図り、明きよや弾丸暗きよなどで十分な排水対策を行う。
- 土壤分析を行い、酸度矯正が必要な場合は、苦土石灰等により土壤改良を行う。
- 紅色雪腐病の保菌種子の持ち込みによる被害を防止するため、薬剤による種子消毒を行う。

## 野 菜

(根菜類)

### 1 ながいも

#### (1) 生育状況

- ・地下部の生育は、地域や場によるバラツキが見られるものの、順調である。
- ・病害虫は、葉渋病、ナガイモコガ、ハダニ類、コガネムシ類、カメムシ類の発生が見られる。

表 ながいもの生育状況 (8月10日現在)

調査 地点	年次	植付期 (月日)	萌芽 揃期 (月日)	つるの ネット頂 到達日 (月日)	8月10日			
					茎葉重 (g)	いも長 (cm)	いも重 (g)	いも径 (mm)
野 菜 研究所	本年 (平年比)	5/27 (2日遅)	6/22 平年並	7/10 (6日早)	234.3 (75%)	40.2 (100%)	178.6 (103%)	38.0 (108%)
	平年	5/25	6/22	7/16	312.8	40.1	173.8	35.1
	前年	5/24	6/21	7/16	372.0	38.3	109.3	28.1
五戸町 上市川	本年 (平年比)	5/14 (8日遅)	6/23 (11日遅)	7/10 (3日遅)	-	43.3 (86%)	218.3 (95%)	39.0 (103%)
	平年	5/6	6/12	7/7	-	50.1	230.1	37.7
	前年	5/20	6/24	7/12	-	45.0	171.3	35.2
東北町 滝沢平	本年 (平年比)	5/14 (6日遅)	6/8 (3日遅)	7/1 (6日早)	-	52.0 (117%)	487.3 (171%)	46.3 (115%)
	平年	5/8	6/5	7/7	-	44.4	284.6	40.2
	前年	5/11	5/29	6/29	-	57.8	577.5	49.6

注) ①平年：野菜研は令和3～令和6年の4か年の平均値。

五戸町、東北町とも平成27～令和6年の10か年の平均値。

なお、東北町は令和6年度から担当農家を変更した（萌芽期のデータを除き、過去のデータの蓄積があるため平年値として利用）。

②種子：野菜研は園試系6の1年子（90～110g）ガンク切除（植付30日前）、五戸町は庄司系の2年子（120～150g）ガンク切除、東北町は庄司系の1年子（100g）頂芽付

③栽植様式：野菜研は畦幅120cm×株間24cm（3,472株/10a）、五戸町は畦幅120cm×株間22cm（3,788株/10a）

東北町は畦幅115cm×株間23cm（3,781株/10a）

④その他：本年調査日は8月8日

## (2) 今後の留意点

- ・「穴落ち」した場合は、速やかに修復する。
- ・8月20日以降の追肥は、茎葉の過繁茂や平いもの発生を助長するおそれがあるため行わない。
- ・葉渋病、炭疽病の防除を徹底するとともに、ナガイモコガ、アブラムシ類、ハダニ類などの害虫の早期発見・早期防除に努める。
- ・採種ほ場では、ウイルス病の伝搬を防ぐためにアブラムシ類の防除を徹底する。
- ・台風など強風や大雨に備え、ネットや支柱を補強し、明きよを手直しして排水溝へ接続するなどの対策を徹底する。

## 2 にんにく

### (1) ほ場の準備

- ・イモグサレセンチュウなどの病害虫が発生していないほ場を選ぶ。
- ・外部からの土壤病害虫の持ち込みを防ぐため、作業は種苗増殖ほ場から行う。
- ・堆きゅう肥や土壤改良資材は、土壤診断結果に基づいて施用し、必要量以上に投入しない。
- ・緑肥は、少なくとも植付けの30日前にすき込み、石灰窒素を10a当たり40kg施用し、ロータリー耕を3回程度行う。
- ・転作田など排水の悪いほ場では、過湿による病害の多発や生育不良を防ぐため、明きよの設置やサブソイラによる弾丸暗きよなどの排水対策を実施するほか、高うね栽培とする。

### (2) 種子の準備

- ・イモグサレセンチュウが発生したほ場のりん球は、種球として絶対に使用しない。
- ・ネギアザミウマ、チューリップサビダニの被害を防ぐため、種球の分割・調整はできるだけ植付け直前に行う。
- ・チューリップサビダニ、イモグサレセンチュウ、黒腐菌核病を対象とした種子消毒を徹底する。
- ・種球の保管中に20°C以下に長時間遭遇すると萌芽・発根が早まるため、室温を概ね20°C以下にならないように管理する。

## 3 夏だいこん

### (1) 生育状況

- ・は種期は平年並で、は種直後の降雨の影響で出芽不良が見られたが、その後の生育は、平年を大幅に上回っており、順調である。
- ・一部では、7月の高温・水不足の影響により、内部が変色する症状（赤芯症）やキスジノミハムシの被害が発生している。

表　だいこんの生育状況（8月10日現在）

調査地点	年次	は種期 (月日)	8月10日		
			葉長 (cm)	葉数 (枚)	根重 (g)
平川市 善光寺平	本年 (平年差・比)	7/3	42.6	21.2	260.1
		(平年並)	(157%)	(136%)	(185%)
	平年	7/3	27.2	15.6	140.6
	前年	7/3	25.2	12.4	37.6

注) ①平年：令和3～令和6年の4か年の平均値

②品種：勇（前年は勇）

③その他：本年調査日は8月8日

## （2）今後の留意点

- ・生育状況を確認しながら適期に収穫する。
- ・軟腐病、キスジノミハムシの防除を徹底するとともに、コナガ、アオムシなどの害虫の早期発見・早期防除に努める。

## 4 秋にんじん

### （1）生育状況

- ・葉数が平年をかなり下回っているものの、葉長は平年並であり、生育は順調である。
- ・一部では、7月の高温・水不足の影響により、出芽不良が見られる。
- ・病害虫の発生は見られない。

表　にんじんの生育状況（8月10日現在）

調査地点	年次	は種期 (月日)	8月10日	
			葉長 (cm)	葉数 (枚)
平川市 大木平	本年 (平年差・比)	6/19	29.5	6.6
		(1日早)	(102%)	(93%)
	平年	6/20	28.9	7.1
	前年	6/19	24.6	6.7

注) ①平年：は種期は平成27年～令和6年の10か年の平均値

②品種：向陽2号

③その他：本年調査日は8月8日

## （2）今後の留意点

- ・黒葉枯病、ヨトウムシなど病害虫の早期発見・早期防除に努める。
- ・大雨に備え、明きよを手直しして排水溝に接続するなどの排水対策を徹底する。

## 5 ごぼう

### (1) 生育状況

- ・草丈は平年をかなり下回っているものの、葉数は平年を大幅に上回っている。
- ・一部では、7月の高温・水不足の影響により、生育のバラツキが見られる。
- ・病害虫はハムシやハモグリバエ類が散見される。

表 ごぼうの生育状況（8月10日現在）

調査地点	年次	は種期 (月日)	8月10日	
			草丈 (cm)	葉数 (枚)
三沢市 三沢	本年 (平年比)	5/14	98.4 (86%)	4.0 (138%)
		12日遅	114.2	2.9
	平年 前年	5/2	106.2	3.4
		5/16		

注) ①平年：平成27～令和6年の10か年の平均値

②品種：柳川理想

③その他：本年調査日は8月8日

### (2) 今後の留意点

- ・「穴落ち」した場合は、速やかに修復する。
- ・黒斑細菌病、黒条病、アブラムシ類等の発生に注意し、防除を徹底する。

## 6 夏秋トマト

### (1) 生育状況

- ・着果量は確保しているものの、7月の高温の影響により、落花や尻腐果、裂果等が見られている。
- ・病害は、灰色かび病、すすかび病、青枯病、虫害は、アザミウマ類、タバコガ類、トマトキバガの発生が見られる。

表 トマトの生育状況（8月10日現在）

調査 地点	年次	定植期 (月日)	5段花房		7段花房		9段花房		11段花房	
			開花期 (月日)	着果数 (個)	開花期 (月日)	着果数 (個)	開花期 (月日)	着果数 (個)	開花期 (月日)	着果数 (個)
中泊町 八幡	本年 (平年比)	5/5	6/22 (8日遅)	3.1 (115%)	7/6 (6日遅)	3.2 (133%)	7/22 (7日遅)	-	8/5 (5日遅)	-
		4/27	6/14	2.7	6/30	2.4	7/15	3.0	7/31	2.3
	前年	5/9	6/25	3.0	7/7	2.8	7/25	2.8	8/7	3.7
三戸町 斗内	本年 (平年比)	5/12	6/27 (1日遅)	2.6 (104%)	7/15 (6日遅)	2.4 (92%)	7/30 (11日遅)	-	-	-
		5/11	7/3	2.5	7/21	2.6	8/10	2.0	9/2	1.5
	前年	5/5	6/27	3.5	7/11	2.8	7/27	2.4	8/20	1.2

- 注) ①平年：中泊町は、令和6年度から担当農家が変更（前担当農家は五所川原市）となったため、平年は参考値、三戸町は平成27～令和6年の10か年の平均値  
②品種：中泊町はりんか409（台木：キングバリア）、三戸町はりんか409（自根）  
③その他：本年調査日は8月8日

## （2）今後の留意点

### ア 温度管理等

- ・遮光資材や肩換気などにより、適正な温度管理を徹底する。また、温度に応じてかん水量を増やしたり、通路かん水を行うほか、生育ステージに応じた肥培管理により草勢の維持に努める。
- ・9月以降は裂果の発生が多くなるので、土壤水分が極端に変化しないように水管理する。

### イ 摘 心

- ・雨よけ栽培では、例年9月5日頃までに開花した花房が収穫できるので、開花直前の花房の上にある葉を2枚残して摘心する。

### ウ 病害虫防除

- ・灰色かび病、葉かび病、アザミウマ類の防除を徹底するとともに、タバコガ類、コナジラミ類、トマトキバガの早期発見・早期防除に努める。

### エ 大雨による浸水等の対策

- ・降雨により滯水している場合は、排水を徹底する。
- ・浸水した場合は、草勢の低下を防ぐため、摘果や早採りで着果負担を軽減する。また、冠水した場合には、動力噴霧器で散水し、作物等の泥を洗い流す。さらに、マルチを除去して、株元を乾かし、根の回復を図るとともに、冠水した果実を早急に取り除く。

## 7 ね ぎ

### （1）生育状況

- ・生育は、草丈、茎径とも平年を下回っている。
- ・一部では、葉先枯れの発生や生育が停滞気味となっている。
- ・病害虫は、葉枯病、軟腐病、黒斑病、アザミウマ類、ハモグリバエ類、ヨトウ類の発生がみられる。

表 ねぎの生育状況（8月10日現在）

調査地点	年次	は種期	定植期	8月10日	
				草丈 (cm)	茎径 (mm)
十和田市 洞内	本年 (平年比)	1/20 (7日早)	4/10 (3日早)	92.3 (87%)	25.8 (96%)
	平年	1/27	4/13	106.3	26.8
	前年	1/23	4/2	91.0	22.7

注) ①平年：令和2年～令和5年の4か年の平均のため参考値

- ②品種：夏扇パワー
- ③その他：本年調査日は8月8日

## (2) 今後の留意点

### ア 管理

- ・追肥・培土は、生育の進み具合に合わせて適期に行う。なお、培土は、葉の分岐部の下までを目安に行う。
- ・軟腐病を回避するため、培土は天気の良い日の地温が低い早朝に行う。
- ・最終培土は、収穫の30日前頃に行い、葉の分岐部まで丁寧に土を寄せ、軟白長30cm以上を確保する。
- ・ほ場の停滞水は生育不良の原因となるため、排水対策を徹底する。

### イ 病害虫防除

- ・べと病、葉枯病、軟腐病、さび病、黒斑病、アザミウマ類など病害虫の防除を徹底する。

## 花 き

### 1 夏秋ギク

#### (1) 生育状況

- ・7月の高温の影響により開花が遅延し、お盆向けの作型では、収穫始めて平年より1日から9日、収穫終わりで平年並から平年より7日遅れた。
- ・ハダニ類やアブラムシ類、アザミウマ類が散見される。病害の発生は見られない。

表 夏秋ギクの収穫時期（8月18日現在）

場 所	年 次	品種名	定植期	収穫期		
				始	盛期	終
新郷村	本年 (平年差)	精の一世	4/22 (2日遅)	7/30 (1日遅)	8/6 (平年並)	8/14 (平年並)
	平年	精の一世	4/20	7/29	8/6	8月14日
	前年	精の一世	4/21	7/28	8/6	8月14日
五所川原市	本年 (平年差)	岩の白扇	4/20 (3日遅)	8/13 (9日遅)	8/15 (8日遅)	8/17 (7日遅)
	平年	岩の白扇	4/17	8/4	8/7	8/10
	前年	岩の白扇	4/25	8/6	8/10	8/13

注) 平年：新郷村は令和3～6年の4か年、五所川原市は平成30～令和6年の7か年の平均値

#### (2) 今後の留意点

##### ア 病害虫防除

- ・白さび病の予防を行うとともに、アザミウマ類、ヤガ類等の発生に注意し、早期発見・早期防除に努める。

##### イ 収穫

- ・2～3分咲きを目安に収穫する。
- ・収穫は涼しい時間帯に行い、切り口を乾かさないようにする。早朝に収穫する場合は、朝露に濡れたまま収穫すると荷傷みの原因となるので乾いてから行う。

##### ウ 親株の管理

- ・収穫後の株を翌年の親株にする場合は、形質が優良で、病害に侵されていないものを残す。
- ・親株は地際から約10cmの高さで刈り込み、直ちに追肥し、土寄せする。追肥量は、1アール当たり窒素成分で0.2～0.3kgを目安とする。

## 2 秋ギク

### (1) 生育状況

- ・生育はおおむね順調である。
- ・アザミウマ類の発生が散見される。

表 秋ギクの生育調査（8月10日現在）

場 所	年 次	品種名	定植期	草丈 (cm)	葉数 (枚)	備 考
五所川原市	本 年 (平年差・比)	神 馬	7 / 10 (4 日遅)	36.0 (95.5%)	17.8 (92.7%)	2本仕立て
	平 年	神 馬	7 / 6	37.7	19.2	2本仕立て
	前 年	神 馬	7 / 9	32.3	16.0	2本仕立て

注) ①平年：五所川原市は平成22～令和6年の15か年の平均値

②本年調査日は8月12日

### (2) 今後の留意点

#### ア 芽かき

- ・わき芽は、小さいうちにかき取る。

#### イ ビーナイン処理（施設栽培のみ）

- ・花首の伸びやすい品種は、ビーナイン顆粒水溶剤等を発らい期に散布する。効果が不十分な場合には摘らい期に2回目の散布を行う。

#### ウ 温度管理

- ・奇形花の発生を防ぐため、高温時には換気を十分に行い、必要に応じて循環扇や寒冷しや等を活用し、施設内温度をできるだけ低くなるよう管理する。

#### エ 病害虫防除

- ・白さび病の予防のほか、アザミウマ類やヤガ類等の害虫が発生しやすい時期なので、早期発見・早期防除を徹底するとともに、ほ場周りの除草や残さの除去等、害虫が発生しにくい環境づくりに努める。

## 3 トルコギキョウ

### (1) 生育状況

- ・7月の高温の影響により早期開花が見られ、お盆向けの作型では、収穫始めて前年より10日、収穫終わりで前年より9日早まった。
- ・病害虫の発生は見られない。

表 トルコギキョウの生育状況（8月10日現在）

場所	年次	品種名	定植期	収穫始	収穫盛期	収穫終	備考
黒石市	本年	ボボヤヅヌイヒヅク	5/4	7/22	7/25	7/29	購入苗
	前年	ボボヤヅヌイヒヅク	5/4	8/1	8/5	8/7	購入苗
(参考)	本年	ひこ星	4/10	7/21	7/26	8/1	自家育苗
青森市	前年	ひこ星	4/4	7/16	7/21	7/26	自家育苗

注) ①黒石市の平年値：令和4年から園地が変更されたため、平年値なし

②青森市の平年値：令和5年から品種が変更されたため、平年値なし

## (2) 今後の留意点

### ア かん水

- ・発らいまでは根の張りをよくするため、乾湿の差をつけて管理する。発らい後はしおれない程度にかん水を減らして軟弱徒長を防ぐ。

### イ 温度管理

- ・ハウス内が高温・過湿にならないように換気するほか、循環扇、寒冷しや等を活用し、適正な温湿度管理に努める。

### ウ 側枝等の整理

- ・不要な側枝は早めに摘み取る。また、頂花らい（1番花）も早めに除去し、上位節から発生する分枝の伸長を促す。

### エ 病害虫防除

- ・アザミウマ類やオオタバコガの発生に注意し、早期発見・早期防除に努める。

### オ 収穫

- ・涼しい時間帯に収穫し、速やかに品質保持剤による前処理を行う。

**畑作・野菜・花き生産情報第6号は令和7年9月19日発行の予定です。**

### ◎熱中症予防運動を展開中です（6月1日～8月31日）

農林水産業分野での熱中症による救急搬送された方は近年増加傾向にあり、令和6年は45名が救急搬送されています。

これから暑い季節は、農作業中に熱中症になるリスクが大きくなりますので、こまめな休憩と水分・塩分補給を行い、立ちくらみやめまい等の熱中症の疑いを感じたら、作業を中止し、体調の回復に努めましょう。

### ◎労働者への熱中症対策が義務化（罰則あり）されました。

本年6月に労働安全衛生規則が改正され、労働者を雇用する全ての事業者に対して、熱中症対策が義務付けられました。

熱中症対応フローなど必要事項を記載した「張り紙」を事務所等に掲示しましょう。

「張り紙」のひな型については、青森県農業・就農情報サイト「農なび青森」に掲載

しています。

詳しくは「農なび青森 熱中症対策」で検索してください。

---

#### ◎ツキノワグマ出没警報発令中!!（5月1日～11月30日）

1人での作業ができるだけ避け、ラジオやクマよけスプレーを携帯するなど、人身被害の防止に努めましょう。

野菜・果実等の収穫残さや弁当の空容器などは、クマを引き寄せる原因となるため、農地に放置せず、適切に処理しましょう。

農地周辺の藪を刈払って見通しを良くすることで、クマの隠れ場所を無くし、クマが農地に近づきにくい環境を整えましょう。

詳細は県ホームページをご確認ください。

([https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/shizen/kuma\\_cyuui.html](https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/shizen/kuma_cyuui.html))

---

#### ◎『日本一健康な土づくり運動』展開中～元気な作物は健康な土が育みます～

土壤診断に基づく適正施肥や土壤改良は、施肥コストの低減にもつながります。

緑肥を活用し、作物の生育に好適な土壤環境づくりを心がけましょう！

効率よく堆肥を使い、堆肥の肥料成分を考慮した化学肥料の低減に努めましょう！

---

#### ◎環境にやさしい農業に取り組んで、みどり認定を受けましょう。

みどりの食料システム法に基づき、土づくりと化学肥料・化学農薬の使用低減などに取り組む農業者を認定【みどり認定】しています。認定を受けると、設備投資の税制優遇や国庫補助事業の採択優遇などのメリットがあります。

申請・お問合せは、最寄りの農林水産事務所にご相談ください。

[https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/noen/midori\\_kihontekinakeikaku.html](https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/noen/midori_kihontekinakeikaku.html)

---

#### ◎令和7年度青森県農薬危害防止運動展開中（6月1日～8月31日）

1 農薬を使用する際は、必ず最新の登録内容を確認し、適正に使用しましょう。

○農林水産省「農薬情報」

[https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n\\_info/](https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_info/)

○農林水産省「農薬登録情報提供システム」

<https://pesticide.maff.go.jp/>

2 飛散防止に努め、住宅地等の近隣で使用する際は、事前に周囲に知らせましょう。

3 クロルピクリン剤など土壤くん蒸剤を使用する際は、必ず厚さ0.03mm以上又は難透過性の被覆資材で被覆しましょう。

4 市販の除草剤には、農作物等の栽培管理に使用できない「農薬ではない除草剤（農薬ではない、非農耕地専用などと記載）」があるので、注意しましょう。

5 農薬は使い切りを徹底し、河川等には絶対に捨ててはいけません。

---

#### ◎食中毒を防ぐため、生産段階から「野菜の衛生管理」に努めましょう。

1 栽培に使用する水の衛生管理や水質の確保に努めましょう。

2 家畜ふん堆肥は、水分調整や定期的な切り返しを行い、十分発酵させましょう。

家畜ふん中の菌の死滅には、55℃以上の温度が3日以上続いている状態が必要です。

堆肥の製造工程では、この温度条件を確認しましょう。

- 3 家畜ふん堆肥を野菜栽培に使用する際は、製造工程や熟成度を確認しましょう。確認できない場合には、堆肥施用から収穫までの期間を、収穫部位が土壌から離れた野菜は2か月、土壌に近い野菜は4か月空けましょう。
- 4 農機具や収穫容器等は清潔な状態を保ち、汚水の流入や野生動物の侵入防止等、栽培環境の整備にも努めましょう。  
※ 野菜の衛生管理指針、家畜ふん堆肥の生産・利用の注意点はこちら  
→[https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/sanzen/yasai\\_eiseikanri.html](https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/sanzen/yasai_eiseikanri.html)



### ◎備えあれば、憂いなし！ 農業保険を活用しましょう！

自然災害や価格下落など、農業経営を取り巻く様々なリスクに備えるため、自分の経営にあった農業保険（国などが掛金の一部を補助する公的保険制度）を活用しましょう。

#### 1 自然灾害リスクをカバーしたい方

農業共済（農作物共済・畑作物共済・園芸施設共済）は、全ての農業者を対象に、米、麦、畑作物、農業用ハウスなどが自然災害によって受ける損失を補償します。

※ナラシ対策や野菜価格安定制度等を利用することもできます。

#### 2 様々なリスクをカバーしたい方

収入保険は、青色申告を行っている農業者を対象に、自然災害や価格低下だけではなく、農業者の経営努力では避けられない収入減少を広く補償します。

※ 詳しくは、お近くの農業共済組合までお問い合わせください。

---

連絡先 農産園芸課  
稻作・畑作振興グループ  
県庁内線 5073  
直通 017-734-9480

---

野菜・花き振興グループ  
県庁内線 5076  
直通 017-734-9481

---