

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、農薬製造者からの申請に基づき、令和8年3月18日に使用制限となる変更の登録が予定されておりますので、ご連絡いたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名	変更内容
第15664号	オキシンドー水和剤80	有機銅水和剤	日本農薬株式会社	別紙1
第18230号	ドキリンフロアブル	有機銅水和剤	日本農薬株式会社	別紙2
第21247号	オキシラン水和剤	キャプタン・有機銅水和剤	日本農薬株式会社	別紙3
第8086号	キノンドー水和剤40	有機銅水和剤	アグロカネショウ株式会社	別紙4
第14359号	キノンドー水和剤80	有機銅水和剤	アグロカネショウ株式会社	別紙5
第17831号	キノンドーフロアブル	有機銅水和剤	アグロカネショウ株式会社	別紙6
第18064号	キンセット水和剤80	銅・有機銅水和剤	アグロカネショウ株式会社	別紙7
第23522号	キノンドー顆粒水和剤	有機銅水和剤	アグロカネショウ株式会社	別紙8

【申請者による変更理由】

現在の登録内容の維持に必要な試験成績の整備に経費と時間を要するため。

【本文書の取扱いに関するお願い】

本周知文書は、変更登録内容を防除指針、防除暦等へ速やかに反映するための情報提供を目的としています。このため、農薬登録日以前においては、本情報を必要に応じて防除指針、防除暦等に関する生産者団体等に提供することは問題ございませんが、インターネット上に掲載する等、変更内容を公開することはお控えください。なお、登録後の掲載は問題ございません。

【本件のお問い合わせ先】

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室
岡田

TEL:03-3502-5969

FAX:03-3501-3774

オキシンドー水和剤80

■変更内容

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

- 作物名「りんご」、「マルメロ」及び「かりん」を削除する。
- 作物名「なし」の使用時期を「収穫21日前まで」に変更する。
- 作物名「なし」について、適用病害虫名「黒斑病、黒星病」の希釈倍数を「1400～2000倍」に、適用病害虫名「輪紋病」の希釈倍数を「1400～1600倍」に変更する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

[変更前]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	有機銅を含む農薬の総使用回数
りんご	黒星病、黒点病、斑点落葉病	1200～1600倍	200～700L/10a	収穫14日前まで	4回以内	散布	7回以内（塗布は3回以内、散布は4回以内）
	輪紋病、すす点病、すす斑病、褐斑病、炭疽病	1200倍					
マルメロ、かりん	黒点病	1200～2000倍		収穫3日前まで			9回以内
なし	黒斑病、黒星病	1200～2000倍	200～700L/10a	収穫3日前まで	9回以内	散布	12回以内（塗布は3回以内、散布は9回以内）
	輪紋病	1200～1600倍					

[変更後]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	有機銅を含む農薬の総使用回数
なし	黒斑病、黒星病	1400～2000倍	200～700L/10a	収穫21日前まで	9回以内	散布	12回以内（塗布は3回以内、散布は9回以内）
	輪紋病	1400～1600倍					

ドキリンフロアブル

■変更内容

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

- 作物名「なし」の使用時期を「収穫21日前まで」に変更する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

[変更前]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	有機銅を含む農薬の総使用回数
なし	黒斑病、黒星病、輪紋病、枝枯細菌病	1000倍	200～700L/10a	収穫3日前まで	9回以内	散布	12回以内（塗布は3回以内、散布は9回以内）

[変更後]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	有機銅を含む農薬の総使用回数
なし	黒斑病、黒星病、輪紋病、枝枯細菌病	1000倍	200～700L/10a	収穫21日前まで	9回以内	散布	12回以内（塗布は3回以内、散布は9回以内）

オキシラン水和剤

■変更内容

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

- 作物名「りんご」の希釈倍数を「700～800倍」に変更し、「500～600倍」を削除する。
- 作物名「なし」の使用時期を「収穫21日前まで」に変更する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

[変更前]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	キャプタンを含む農薬の総使用回数	有機銅を含む農薬の総使用回数
りんご	黒点病、斑点落葉病、黒星病、輪紋病	500～800倍	200～700L/10a	収穫14日前まで	4回以内	散布	6回以内	7回以内（塗布は3回以内、散布は4回以内）
	褐斑病、すす点病、すす斑病、炭疽病	500～600倍						
なし	黒星病、黒斑病、輪紋病	500～600倍		収穫3日前まで	9回以内		9回以内	12回以内（塗布は3回以内、散布は9回以内）
	炭疽病、褐色斑点病、黒斑細菌病	500倍						

[変更後]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	キャプタンを含む農薬の総使用回数	有機銅を含む農薬の総使用回数
りんご	黒点病、斑点落葉病、黒星病、輪紋病	700～800倍	200～700L/10a	収穫14日前まで	4回以内	散布	6回以内	7回以内（塗布は3回以内、散布は4回以内）
なし	黒星病、黒斑病、輪紋病	500～600倍						
	炭疽病、褐色斑点病、黒斑細菌病	500倍						

キノンドー水和剤40

■変更内容

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

- 作物名「りんご」を削除する。
- 作物名「なし」の使用時期を「収穫21日前まで」に変更する。
- 作物名「なし」の希釈倍数「600～800倍」を「700～800倍」に変更する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

〔変更前〕

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	有機銅を含む農薬の総使用回数
りんご	黒星病、斑点落葉病、黒点病	500～800倍	200～ 700L/10a	収穫14日前まで	4回以内	散布	7回以内（塗布は3回以内、散布は4回以内）
なし	黒斑病、黒星病	800～1000倍		収穫3日前まで	9回以内		12回以内（塗布は3回以内、散布は9回以内）
	輪紋病	600～800倍					

〔変更後〕

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	有機銅を含む農薬の総使用回数
なし	黒斑病、黒星病	800～1000倍	200～ 700L/10a	収穫21日前まで	9回以内	散布	12回以内（塗布は3回以内、散布は9回以内）
	輪紋病	700～800倍					

キノンドー水和剤80

■変更内容

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

- 作物名「りんご」、「マルメロ」及び「かりん」を削除する。
- 作物名「なし」の使用時期を「収穫21日前まで」に変更する。
- 作物名「なし」の希釈倍数「1200～2000倍」を「1400～2000倍」に変更し、「1200倍」を削除する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

[変更前]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	有機銅を含む農薬の総使用回数	
りんご	黒星病、斑点落葉病	1200～1600倍	200～ 700L/10a	収穫14日前 まで	4回以内	散布	7回以内（塗布は3回 以内、散布は4回以 内）	
	輪紋病、褐斑病、炭 疽病、すす斑病、す す点病、黒点病	1200倍						
なし	黒星病、黒斑病	1200～2000倍		収穫3日前ま で	9回以内		4回以内	12回以内（塗布は3回 以内、散布は9回以 内）
	輪紋病	1200倍						
マルメロ かりん	黒点病 ごま色斑点病	1200～2000倍 1200倍		収穫14日前 まで	4回以内			4回以内

[変更後]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	有機銅を含む農薬の総使用回数
なし	黒星病、黒斑病	1400～2000倍	200～ 700L/10a	収穫21日前 まで	9回以内	散布	12回以内（塗布は3回 以内、散布は9回以 内）

キノンドーフロアブル

■変更内容

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

- 作物名「なし」の使用時期を「収穫21日前まで」に変更する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

[変更前]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	有機銅を含む農薬の総使用回数
なし	黒斑病、輪紋病、 黒星病、褐色斑点病	1000倍	200～ 700L/10a	収穫3日前まで	9回以内	散布	12回以内（塗布は3回以内、散布は9回以内）

[変更後]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	有機銅を含む農薬の総使用回数
なし	黒斑病、輪紋病、 黒星病、褐色斑点病	1000倍	200～ 700L/10a	収穫21日前まで	9回以内	散布	12回以内（塗布は3回以内、散布は9回以内）

キンセツ水和剤80

■変更内容

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

- 作物名「りんご」を削除する。
- 作物名「なし」の使用時期を「収穫21日前まで」に変更する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

[変更前]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	銅を含む農薬の総使用回数	有機銅を含む農薬の総使用回数
りんご	斑点落葉病、輪紋病、褐斑病、炭疽病	1000～1200倍	200～700L/10a	収穫14日前まで	4回以内	散布	—	7回以内（塗布は3回以内、散布は4回以内）
なし	輪紋病、黒星病			収穫3日前まで	9回以内			12回以内（塗布は3回以内、散布は9回以内）

[変更後]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	銅を含む農薬の総使用回数	有機銅を含む農薬の総使用回数
なし	輪紋病、黒星病	1000～1200倍	200～700L/10a	収穫21日前まで	9回以内	散布	—	12回以内（塗布は3回以内、散布は9回以内）

キノンドー顆粒水和剤

■変更内容

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

- 作物名「りんご」を削除する。
- 作物名「なし」の使用時期を「収穫21日前まで」に変更する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

[変更前]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	有機銅を含む農薬の総使用回数
りんご	斑点落葉病、黒星病、輪紋病、褐斑病、すす点病、すす斑病、黒点病、炭疽病	1000倍	200～700L/10a	収穫14日前まで	4回以内	散布	7回以内（塗布は3回以内、散布は4回以内）
なし	黒星病、黒斑病、輪紋病			収穫3日前まで	9回以内		12回以内（塗布は3回以内、散布は9回以内）

[変更後]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	有機銅を含む農薬の総使用回数
なし	黒星病、黒斑病、輪紋病	1000倍	200～700L/10a	収穫21日前まで	9回以内	散布	12回以内（塗布は3回以内、散布は9回以内）