

令和 8 年 水稻病虫害発生情報 第 2 号 (7 月中旬)

1 いもち病（発生量：少ない）

葉いもちの発生は、いずれの地点も確認されなかった。

表 1 7 月中旬巡回調査における葉いもちの発生状況

地域	年次	調査 地点数	程度別発生地点率 (%)					発生地点 率 (%)	発病度
			甚(>70)	多(>40)	中(>20)	少(>0)	無		
津軽	本年	25	0	0	0	0	100	0	0
	前年	25	0	0	0	0	100	0	0
	平年	34	0	0	0.3	5.0	94.7	5.3	0.1
県南	本年	15	0	0	0	0	100	0	0
	前年	15	0	0	0	0	100	0	0
	平年	27	0	0.6	0	5.7	93.7	6.3	0.6
県計	本年	40	0	0	0	0	100	0	0
	前年	40	0	0	0	0	100	0	0
	平年	61	0	0.1	0.1	3.7	96.0	4.0	0.2

2 アカヒゲホソミドリカスミカメ（発生量：やや多い）

畦畔すくい取り調査による発生地点率は、津軽地域で平年より高く、県南地域で平年よりやや高く、捕獲数は津軽地域で平年並、県南地域で平年より少なかった。

なお、畦畔での捕獲数が10頭を越える（「多」）地点が西北、三八地域で、30頭を超える（「甚」）地点が中南地域で確認された。

本田すくい取り調査による発生地点率は、津軽地域で平年より低く、県南地域で平年より高く、捕獲数は津軽地域で平年より少なく、県南地域で平年より多かった。

表 2 7 月中旬巡回調査におけるアカヒゲホソミドリカスミカメの捕獲数（畦畔すくい取り）

地域	年次	調査 地点数	程度別発生地点率 (%)					発生地点 率 (%)	平均 捕獲数
			甚(>30)	多(>10)	中(>3)	少(>0)	無		
津軽	本年	25	4.0	4.0	28.0	36.0	28.0	72.0	5.8
	前年	25	12.0	16.0	28.0	24.0	20.0	80.0	10.6
	平年	34	5.8	8.9	22.5	24.5	38.3	61.7	6.5
県南	本年	15	0	6.7	26.7	26.7	40.0	60.0	2.9
	前年	15	0	6.7	40.0	13.3	40.0	60.0	3.5
	平年	26	2.9	6.2	20.0	27.7	43.2	56.8	4.7
県計	本年	40	2.5	5.0	27.5	32.5	32.5	67.5	4.8
	前年	40	7.5	12.5	32.5	20.0	27.5	72.5	7.9
	平年	60	4.7	7.9	21.3	26.1	40.1	59.9	5.8

表 3 7 月中旬巡回調査におけるアカヒゲホソミドリカスミカメの捕獲数（本田すくい取り）

地域	年次	調査 地点数	程度別発生地点率 (%)					発生地点 率 (%)	平均 捕獲数
			甚(>30)	多(>10)	中(>3)	少(>0)	無		
津軽	本年	25	0	0	0	8.0	92.0	8.0	0.1
	前年	25	0	4.0	0	24.0	72.0	28.0	1.0
	平年	34	0	1.2	0.5	12.5	85.8	14.2	0.4
県南	本年	15	0	0	0	20.0	80.0	20.0	0.2
	前年	15	0	0	0	6.7	93.3	6.7	0.1
	平年	27	0	0	1.3	6.7	92.0	8.0	0.1
県計	本年	40	0	0	0	12.5	87.5	12.5	0.1
	前年	40	0	2.5	0	17.5	80.0	20.0	0.6
	平年	61	0	0.8	0.8	10.0	88.4	11.6	0.3

3 アカスジカスミカメ（発生量：やや多い）

畦畔すくい取り調査による発生地点率は、津軽地域で平年より高く、県南地域で平年より低く、捕獲数は津軽地域で平年より多く、県南地域で平年より少なかった。

なお、畦畔での捕獲数が10頭を超える（「多」）地点が西北地域で、30頭を超える（「甚」）地点が中南地域で確認された。

本田すくい取り調査による発生地点率は、津軽地域で平年より高く、県南地域で平年より低く、捕獲数は津軽地域で平年並、県南地域で平年より少なかった。

表4 7月中旬巡回調査におけるアカスジカスミカメの捕獲数（畦畔すくい取り）

地域	年次	調査 地点数	程度別発生地点率（％）					発生地点 率（％）	平均 捕獲数
			甚(>30)	多(>10)	中(>3)	少(>0)	無		
津軽	本年	25	16.0	4.0	12.0	8.0	60.0	40.0	16.8
	前年	25	12.0	20.0	20.0	12.0	36.0	64.0	22.0
	平年	34	3.9	5.0	5.4	12.7	73.0	27.0	4.5
県南	本年	15	0	0	0	6.7	93.3	6.7	0.2
	前年	15	6.7	6.7	6.7	6.7	73.3	26.7	4.3
	平年	26	2.1	3.2	4.2	11.0	79.5	20.5	2.5
県計	本年	40	10.0	2.5	7.5	7.5	72.5	27.5	10.6
	前年	40	10.0	15.0	15.0	10.0	50.0	50.0	15.4
	平年	60	3.1	4.3	5.0	11.9	75.7	24.3	3.7

表5 7月中旬巡回調査におけるアカスジカスミカメの捕獲数（本田すくい取り）

地域	年次	調査 地点数	程度別発生地点率（％）					発生地点 率（％）	平均 捕獲数
			甚(>30)	多(>10)	中(>3)	少(>0)	無		
津軽	本年	25	0	0	0	8.0	92.0	8.0	0.1
	前年	25	0	0	4.0	8.0	88.0	12.0	0.3
	平年	34	0	0.4	0.8	2.0	96.8	3.2	0.1
県南	本年	15	0	0	0	0	100	0	0
	前年	15	0	0	0	20.0	80.0	20.0	0.3
	平年	27	0	0	0.4	4.7	94.9	5.1	0.1
県計	本年	40	0	0	0	5.0	95.0	5.0	0.1
	前年	40	0	0	2.5	12.5	85.0	15.0	0.3
	平年	61	0	0.3	0.7	3.1	96.0	4.0	0.1

4 フタオビコヤガ（発生量：少ない）

巡回調査における被害状況は、発生地点率及び被害度がいずれの地域でも平年より低かった。

すくい取り調査では、いずれの地域も発生地点率が平年より低く、捕獲数が平年より少なかった。

表6 7月中旬巡回調査におけるフタオビコヤガの被害状況

地域	年次	調査 地点数	程度別発生地点率（％）					発生地点 率（％）	被害度
			甚(>70)	多(>40)	中(>20)	少(>0)	無		
津軽	本年	25	0	0	0	20.0	80.0	20.0	0.2
	前年	25	0	0	0	16.0	84.0	16.0	0.6
	平年	34	0	0	1.8	50.2	48.0	52.0	2.9
県南	本年	15	0	0	0	13.3	86.7	13.3	0.7
	前年	15	0	0	0	20.0	80.0	20.0	0.9
	平年	27	0	0	1.0	47.6	51.4	48.6	2.5
県計	本年	40	0	0	0	17.5	82.5	17.5	0.4
	前年	40	0	0	0	17.5	82.5	17.5	0.7
	平年	61	0	0	1.4	49.2	49.3	50.7	2.7

表7 7月中旬巡回調査におけるフタオビコヤガの捕獲数（本田すくい取り）

地域	年次	調査 地点数	程度別発生地点率（％）					発生地点 率（％）	平均 捕獲数
			甚（＞100）	多（＞50）	中（＞25）	少（＞0）	無		
津軽	本年	25	0	0	0	16.0	84.0	16.0	0.2
	前年	25	0	0	0	12.0	88.0	12.0	0.3
	平年	34	0.6	0	1.1	40.5	57.8	42.2	2.7
県南	本年	15	0	0	0	26.7	73.3	26.7	0.9
	前年	15	0	0	0	6.7	93.3	6.7	0.1
	平年	27	0	0.7	1.0	40.3	58.0	42.0	2.6
県計	本年	40	0	0	0	20.0	80.0	20.0	0.5
	前年	40	0	0	0	10.0	90.0	10.0	0.2
	平年	61	0.3	0.3	1.1	40.6	57.7	42.3	2.6

5 コバネイナゴ（発生量：少ない）

巡回調査による被害状況は、発生地点率がいずれの地域でも平年より低く、被害度が津軽地域で平年より低く、県南地域で平年より高かった。

すくい取り調査では、いずれの地域も発生地点率が平年より低く、捕獲数が平年より少なかった。

表8 7月中旬巡回調査におけるコバネイナゴの被害状況

地域	年次	調査 地点数	程度別発生地点率（％）					発生地点 率（％）	被害度
			甚（＞70）	多（＞40）	中（＞20）	少（＞0）	無		
津軽	本年	25	0	0	4.0	36.0	60.0	40.0	2.6
	前年	25	0	0	16.0	64.0	20.0	80.0	9.4
	平年	34	0	0	18.2	68.7	13.1	86.9	9.3
県南	本年	15	0	0	6.7	13.3	80.0	20.0	1.9
	前年	15	0	0	0	40.0	60.0	40.0	1.5
	平年	27	0	0	0	50.7	49.3	50.7	1.6
県計	本年	40	0	0	5.0	27.5	67.5	32.5	2.3
	前年	40	0	0	10.0	55.0	35.0	65.0	6.4
	平年	61	0	0	10.3	61.0	28.7	71.3	6.0

表9 7月中旬巡回調査におけるコバネイナゴの捕獲数（本田すくい取り）

地域	年次	調査 地点数	程度別発生地点率（％）					発生地点 率（％）	平均 捕獲数
			甚（＞100）	多（＞50）	中（＞25）	少（＞0）	無		
津軽	本年	25	0	0	0	48.0	52.0	48.0	1.3
	前年	25	4.0	0	4.0	80.0	12.0	88.0	11.7
	平年	34	2.0	5.1	10.7	64.6	17.6	82.4	15.2
県南	本年	14	0	0	0	21.4	78.6	21.4	0.2
	前年	14	0	0	0	14.3	85.7	14.3	0.4
	平年	27	0	0.3	0	49.0	50.7	49.3	1.8
県計	本年	40	0	0	0	37.5	62.5	37.5	0.9
	前年	40	2.5	0	2.5	57.5	37.5	62.5	7.5
	平年	61	1.1	3.1	6.0	58.1	31.7	68.3	9.4

6 ウンカ類（発生量：少ない）

すくい取り調査において捕獲された種別はヒメトビウンカで、いずれの地域も発生地点率が平年より低く、捕獲数が平年より少なかった。

表10 7月中旬巡回調査におけるセジロウンカの捕獲数（本田すくい取り）

地域	年次	調査 地点数	程度別発生地点率（％）					発生地点 率（％）	平均 捕獲数
			甚（≧701）	多（≧301）	中（≧101）	少（≧1）	無		
津軽	本年	25	0	0	0	0	100	0	0
	前年	25	0	0	0	16.0	84.0	16.0	0.2
	平年	34	0	0	0	24.0	76.0	24.0	0.5
県南	本年	15	0	0	0	0	100	0	0
	前年	15	0	0	0	13.3	86.7	13.3	0.1
	平年	27	0	0	0	25.4	74.6	25.4	0.5
県計	本年	40	0	0	0	0	100	0	0
	前年	40	0	0	0	15.0	85.0	15.0	0.2
	平年	61	0	0	0	24.4	75.6	24.4	0.5

表11 7月中旬巡回調査におけるヒメトビウンカの捕獲数（本田すくい取り）

地域	年次	調査 地点数	程度別発生地点率（％）					発生地点 率（％）	平均 捕獲数
			甚（＞100）	多（＞30）	中（＞10）	少（＞0）	無		
津軽	本年	25	0	0	0	4.0	96.0	4.0	0.0
	前年	25	0	0	0	0	100	0	0
	平年	34	0	0	0.3	23.6	76.1	23.9	0.4
県南	本年	15	0	0	0	13.3	86.7	13.3	0.3
	前年	15	0	0	0	6.7	93.3	6.7	0.1
	平年	27	0	0	0.7	41.4	57.8	42.2	1.1
県計	本年	40	0	0	0	7.5	92.5	7.5	0.1
	前年	40	0	0	0	2.5	97.5	2.5	0.1
	平年	61	0	0	0.5	31.7	67.8	32.2	0.7

7 その他の病害虫

7月中旬巡回調査では、紋枯病、ばか苗病、縞葉枯病、コブノメイガ、ニカメイガ、ツマグロヨコバイは確認されなかった。

【この情報に関する問合せ先】

〒030-0113 青森市第二問屋町 4-11-6 青森県病害虫防除所
TEL:017-729-1717 FAX:017-729-1900 担当：主幹 菊池晴志