

令和8年度野菜病害虫発生情報 第7号
作物名：ねぎ（7月中旬）

1 さび病（発生量：津軽地域 やや多い、県南地域 少ない）

津軽地域では、発生地点率は平年並で、発病株率及び発病度は平年より高かった。
県南地域では、発生地点率、発病株率及び発病度は平年より低かった。

巡回調査におけるさび病の発生状況

調査時期	地域	年次	調査 地点数	発生程度別地点率（%）					発生地点 率（%）	発病株率 （%）	発病度
				甚	多	中	少	無			
7月中旬	津軽	本年	7	0	14.3	0	57.1	28.6	71.4	16.0	4.4
		前年	6	0	0	0	100	0	100	5.7	1.4
		平年	11	0	1.8	15.8	50.6	31.9	68.1	10.5	2.5
	県南	本年	9	0	0	22.2	44.4	33.3	66.7	12.2	3.2
		前年	10	0	0	40.0	40.0	20.0	80.0	21.6	6.5
		平年	21	0.6	4.4	18.4	55.7	20.9	79.1	16.5	4.7
	県計	本年	16	0	6.3	12.5	50.0	31.3	68.8	13.9	3.7
		前年	16	0	0	25.0	62.5	12.5	87.5	15.6	4.6
		平年	32	0.3	3.4	17.4	54.4	24.4	75.6	14.4	3.9

注）発生程度：発病度 甚 41以上、多 21～40、中 6～20、少 1～5

2 斑点性病害（黒斑病・葉枯病）（発生量：津軽地域 多い、県南地域 平年並）

津軽地域では、発生地点率、発病株率及び発病度は平年より高かった。
県南地域では、発生地点率は平年並で、発病株率及び発病度は平年より低かった。

巡回調査における斑点性病害（黒斑病・葉枯病）の発生状況

調査時期	地域	年次	調査 地点数	発生程度別地点率（%）					発生地点 率（%）	発病株率 （%）	発病度
				甚	多	中	少	無			
7月中旬	津軽	本年	7	0	0	0	57.1	42.9	57.1	11.4	3.4
		前年	6	0	0	0	66.7	33.3	66.7	9.0	2.3
		平年	11	0	0	0	42.4	57.6	42.4	4.6	1.2
	県南	本年	9	0	0	0	66.7	33.3	66.7	2.7	0.7
		前年	10	0	0	0	90.0	10.0	90.0	11.0	3.4
		平年	21	0	0.3	1.2	62.9	35.6	64.4	6.7	1.9
	県計	本年	16	0	0	0	62.5	37.5	62.5	6.5	1.8
		前年	16	0	0	0	81.3	18.8	81.3	10.3	2.9
		平年	32	0	0.2	0.8	55.5	43.5	56.5	5.8	1.6

注）発生程度：発病度 甚 61以上、多 41～60、中 21～40、少 1～20

3 べと病（発生量：津軽地域 多い、県南地域 やや多い）

津軽地域では、発生地点率及び発病株率は平年より高かった。
県南地域では、発生地点率は平年より高く、発病株率は平年よりやや低かった。

巡回調査におけるべと病の発生状況

調査時期	地域	年次	調査 地点数	発生程度別地点率 (%)					発生地点 率 (%)	発病株率 (%)
				甚	多	中	少	無		
7月中旬	津軽	本年	7	0	0	0	28.6	71.4	28.6	1.7
		前年	6	0	0	0	0	100	0	0
		平年	11	0	0	2.0	2.8	95.2	4.8	0.5
	県南	本年	9	0	0	22.2	33.3	44.4	55.6	4.7
		前年	10	0	0	0	0	100	0	0
		平年	21	4.5	3.5	7.3	22.9	61.7	38.3	6.60
	県計	本年	16	0	0	12.5	31.3	56.3	43.8	3.4
		前年	16	0	0	0	0	100	0	0
		平年	32	2.9	2.3	5.5	15.8	73.6	26.4	4.4

注) 発生程度：発病株率 甚 51以上、多 31～50、中 11～30、少 1～10

4 ネギアザミウマ（発生量：津軽地域 平年並、県南地域 やや少ない）

津軽地域では、発生地点率は平年より高く、被害株率及び被害度は平年より低かった。
 県南地域では、発生地点率は平年並で、被害株率及び被害度は平年より低かった。

巡回調査におけるネギアザミウマの発生状況

調査時期	地域	年次	調査 地点数	発生程度別地点率 (%)					発生地点 率 (%)	被害株率 (%)	被害度
				甚	多	中	少	無			
7月中旬	津軽	本年	7	0	0	0	85.7	14.3	85.7	8.0	2.0
		前年	6	0	0	33.3	66.7	0	100	29.0	7.3
		平年	11	0.9	2.4	11.9	52.5	32.2	67.8	17.5	4.1
	県南	本年	9	0	0	11.1	44.4	44.4	55.6	8.2	2.1
		前年	10	0	0	0	100	0	100	14.6	3.7
		平年	21	2.1	3.6	5.6	48.8	39.9	60.1	15.0	3.8
	県計	本年	16	0	0	6.3	62.5	31.3	68.8	8.1	2.0
		前年	16	0	0	12.5	87.5	0	100	20.0	5.0
		平年	32	1.7	3.3	7.9	49.8	37.3	62.7	16.2	4.0

注) 発生程度：被害度 甚 31以上、多 21～30、中 11～20、少 1～10

5 ネギハモグリバエ（発生量：平年並）

発生地点率及び被害度は平年並で、被害株率は平年よりやや低かった。


巡回調査におけるネギハモグリバエの発生状況

調査時期	地域	年次	調査 地点数	発生程度別地点率 (%)					発生地点 率 (%)	被害株率 (%)	被害度
				甚	多	中	少	無			
7月中旬	津軽	本年	7	0	0	0	28.6	71.4	28.6	0.9	0.2
		前年	6	0	0	0	100	0	100	3.7	0.9
		平年	11	0	0	0	33.6	66.4	33.6	1.5	0.3
	県南	本年	9	0	0	0	55.6	44.4	55.6	4.0	1.1
		前年	10	0	0	10.0	90.0	0	100	20.2	5.1
		平年	21	0	0	1.3	50.2	48.5	51.5	5.1	1.1
	県計	本年	16	0	0	0	43.8	56.3	43.8	2.6	0.7
		前年	16	0	0	6.3	93.8	0	100	14.0	3.5
		平年	32	0	0	0.8	44.5	54.7	45.3	3.8	0.9

注) 発生程度：被害度 甚 31以上、多 21～30、中 11～20、少 1～10

6 ネギコガ（発生量：少ない）

性フェロモントラップによる誘殺数は平年より少なく推移している。
巡回調査では発生地点率、被害株率及び被害葉率は平年より低かった。



性フェロモントラップにおけるネギコガの半旬別誘殺推移

巡回調査におけるネギコガの発生状況

調査時期	地域	年次	調査 地点数	発生程度別地点率（％）					発生地点 率（％）	被害株率 （％）	被害葉率 （％）
				甚	多	中	少	無			
7月中旬	津軽	本年	7	0	0	0	14.3	85.7	14.3	0.3	0.1
		前年	6	0	0	0	16.7	83.3	16.7	1.3	0.4
		平年	11	0	0	0	43.9	56.1	43.9	2.5	0.9
	県南	本年	9	0	0	0	11.1	88.9	11.1	0.4	0.1
		前年	10	0	0	0	50.0	50.0	50.0	6.4	2.1
		平年	21	0	0	0	32.3	67.7	32.3	2.3	0.8
	県計	本年	16	0	0	0	12.5	87.5	12.5	0.4	0.1
		前年	16	0	0	0	37.5	62.5	37.5	4.5	1.5
		平年	32	0	0	0	36.1	63.9	36.1	2.4	0.8

注）発生程度：被害葉率 甚 76以上、多 51～75、中 26～50、少 1～25

7 ネギアブラムシ（発生量：－）

発生は認められなかった。

巡回調査におけるネギアブラムシの発生状況


調査時期	地域	年次	調査 地点数	発生程度別地点率（％）					発生地点 率（％）	寄生株率 （％）
				甚	多	中	少	無		
7月中旬	津軽	本年	7	0	0	0	0	100	0	0
		前年	6	0	0	0	0	100	0	0
		平年	8	0	0	0	0	100	0	0
	県南	本年	9	0	0	0	0	100	0	0
		前年	10	0	0	0	0	100	0	0
		平年	20	0	0	0	0	100	0	0
	県計	本年	16	0	0	0	0	100	0	0
		前年	16	0	0	0	0	100	0	0
		平年	28	0	0	0	0	100	0	0

注）発生程度：寄生株率 甚 76以上、多 51～75、中 26～50、少 1～25

8 シロイチモジヨトウ（発生量：－）

性フェロモントラップによる誘殺数は、つがる市で7月第3半旬から増加して平年より多く、十和田市では平年より少なく推移している。

巡回調査では発生は認められなかった。



性フェロモントラップにおけるシロイチモジヨトウの半月別誘殺推移

巡回調査におけるシロイチモジヨトウの発生状況

調査時期	地域	年次	調査 地点数	発生程度別地点率 (%)					発生地点 率 (%)	被害株率 (%)
				甚	多	中	少	無		
7月中旬	津軽	本年	7	0	0	0	0	100	0	0
		前年	6	0	0	0	0	100	0	0
		平年	8	0	0	0	0	100	0	0
	県南	本年	9	0	0	0	0	100	0	0
		前年	10	0	0	0	0	100	0	0
		平年	20	0	0	0	0	100	0	0
	県計	本年	16	0	0	0	0	100	0	0
		前年	16	0	0	0	0	100	0	0
		平年	28	0	0	0	0	100	0	0

注) 発生程度：被害株率 甚 41以上、多 21～40、中 11～20、少 1～10

【この情報に関する問合せ先】

担当：総括主幹 鈴木 千秋

030-0113 青森市第二問屋町 4-11-6

TEL:017-729-1717 FAX:017-729-1900