

令和 8 年度病虫害防除指導情報 第 2 号

作物名：水稻

病虫害名：葉いもち、穂いもち

7 月下旬以降の曇雨天により、いもち病の発生に好適な条件が出現しています。

直播栽培など出穂前のほ場では、葉いもちの早期発見に努め、適切に防除を行いましょう。

穂いもちの防除は、出穂直前と穂揃期の 2 回散布を基本とし、防除適期を失ないようにしまししょう。

1 B L A S T A M による葉いもちの感染好適条件の出現状況

- (1) 本田での葉いもちの初発生は、7 月 15 日に鱈ヶ沢町、7 月 24 日に藤崎町で確認されたが、その後の拡大は見られなかった。
- (2) B L A S T A M による感染好適条件が 7 月下旬から県内各地で出現している(表 1)。感染好適条件の出現後、およそ 7～10 日後に病斑が確認されることから、早期発見に努め、適切に防除する。

表 1 B L A S T A M による葉いもちの感染好適条件出現状況

地域	地点	7 月										8 月					
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5
東青	青森	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
中南	弘前	-	-	-	△	-	●	-	●	-	-	●	●	-	-	-	-
	黒石	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	●	●	-	-	-	-
西北	五所川原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
	鱒ヶ沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-
上北	十和田	-	-	△	-	-	-	-	△	●	-	●	-	-	-	-	-
	三沢	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	△	-	-	-	-
	野辺地	-	-	●	-	-	●	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-
下北	むつ	-	-	●	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-
三八	八戸	※	-	-	-	-	-	-	-	●	-	△	-	-	-	-	-
	三戸	-	-	-	△	●	●	-	●	-	-	●	●	-	-	-	-

注) ●は感染好適条件、△は感染好適に準ずる条件、※は判定不能を示す。

2 防除対策

- (1) 上位葉に葉いもちがみられる場合や抵抗性の弱い品種で葉いもちがみられる場合には、穂揃 5～7 日後にも薬剤散布を行う。
- (2) 穂いもちの防除は、出穂直前と穂揃期の 2 回散布を基本とし、防除適期を失しないよう注意する。

【この情報に関する問合せ先】

担当：主幹 菊池 晴志

〒030-0113 青森市第二問屋町4-11-6

TEL:017-729-1717 FAX:017-729-1900