

令和8年 畑作病害虫発生情報 第8号

作物名：大豆（9月上旬）

1. ベと病（発生量：多い）
津軽、県南地域全ての地点で発生が確認され、発生地点率、発病株率は平年より高かった。

べと病の発生状況

調査時期	地域	年次	調査 地点数	発生程度別地点率（％）				発生地点率 （％）	発病株率 （％）
				甚	多	中	少		
9月上旬	津軽	本年	12	0	0	0	100	100	100
		前年	12	0	0	0	100	100	100
		平年	14	0	3.7	8.7	60.1	72.5	28.5
	県南	本年	6	0	0	0	100	100	100
		前年	6	0	0	0	100	100	100
		平年	6	1.4	3.3	8.3	60.6	73.7	29.9

注）発生程度：発病度 甚 76以上、多 51～75、中 26～50、少 25以下

2. わい化病（発生量：一）
全ての地点で発生は認められなかった。

わい化病の発生状況

調査時期	地域	年次	調査 地点数	発生程度別地点率（％）				発生地点率 （％）	発病株率 （％）
				甚	多	中	少		
9月上旬	津軽	本年	12	0	0	0	0	0	0
		前年	12	0	0	0	0	0	0
		平年	14	0	0	0	3.2	3.2	0.0
	県南	本年	6	0	0	0	0	0	0
		前年	6	0	0	0	0	0	0
		平年	6	0	0	0	13.7	13.7	0.0

注）発生程度：発病株率 甚 61以上、多 41～60、中 21～40、少 20以下

3. アブラムシ類（発生量：少ない）
9月上旬の調査ではアブラムシ類の寄生は認められなかった。

アブラムシ類の発生状況

調査時期	地域	年次	調査 地点数	発生程度別地点率（％）				発生地点率 （％）	1 複葉当たり 寄生数 （頭）
				甚	多	中	少		
9月上旬	津軽	本年	12	0	0	0	0	0	0
		前年	12	0	0	0	0	0	0
		平年	14	0	0	3.2	13.0	16.2	0.15
	県南	本年	6	0	0	0	0	0	0
		前年	6	0	0	0	0	0	0
		平年	6	0	2.0	8.4	2.0	12.4	1.16

注）発生程度：1 複葉当たりの寄生虫数 甚 51以上、多 11～50、中 1～10、少 1未満

4. 吸実性カメムシ類（発生量：少ない）

津軽、県南地域ともに、カメムシ類の寄生は認められなかった。

吸実性カメムシ類の発生状況

調査時期	地域	年次	調査 地点数	発生程度別地点率（％）				発生地点率 （％）	25株当たり 寄生数 （頭）
				甚	多	中	少		
9月上旬	津軽	本年	12	0	0	0	0	0	0
		前年	12	0	0	0	33.3	33.3	0.50
		平年	14	0	0	0.8	24.1	24.9	0.42
	県南	本年	6	0	0	0	0	0	0
		前年	6	0	0	16.7	16.7	33.3	1.83
		平年	6	0	0	1.7	17.2	18.9	0.37

注）発生程度：甚 25株当たり寄生数51以上、多 26～50、中 6～25、少 1～5

5. ウコンノメイガ（発生量：多い）

発生地点率は津軽、県南地域とも平年より高かった。

葉巻数は津軽地域で平年並、県南地域ではやや多かった

ウコンノメイガ幼虫による葉巻症状の発生状況

調査時期	地域	年次	調査 地点数	発生程度別地点率（％）				発生地点率 （％）	株当たり 葉巻数 （枚）
				甚	多	中	少		
9月上旬	津軽	本年	12	0	0	16.7	50.0	66.7	0.44
		前年	12	0	0	0	41.7	41.7	0.08
		平年	14	0	0	4.1	45.2	49.3	0.21
	県南	本年	6	0	16.7	66.7	16.7	100.0	2.30
		前年	6	0	0	16.7	66.7	83.3	0.45
		平年	6	0	0	7.9	57.0	64.9	0.26

注）発生程度：甚 株当たり葉巻数11以上、多 6～10、中 1～5、少 1未満

6. その他のチョウ目幼虫（発生量：少ない）
すべての地点で発生が確認され、発生程度は「少」であった。

チョウ目幼虫による食害状況

調査時期	地域	年次	調査地点数	発生程度別地点率（％）				発生地点率（％）	食害度	地点当たりの幼虫捕獲数（頭）
				甚	多	中	少			
9月上旬	津軽	本年	12	0	0	0	100	100	9.92	0.17
		前年	12	0	0	0	100	100	14.75	0.42
		平年	14	6.4	6.5	17.8	69.4	100	26.80	0.57
	県南	本年	6	0	0	0	100	100	4.67	0
		前年	6	0	0	0	100	100	10.67	0
		平年	6	1.4	6.2	26.4	64.0	98.0	19.44	0.65

注）発生程度：甚 被害葉率76以上、多 51～75、中 26～50、少 1～25



払い落としによるチョウ目捕獲幼虫内訳

地域	調査地点数	総捕獲数（頭）	幼虫種別捕獲数（頭）					
			ウコンノメイガ	ツメクサガ、オオタバコガ	ウバ類	ヨトウガ	ハスモンヨトリ	その他
津軽	12	2	0	1	1	0	0	0
県南	6	0	0	0	0	0	0	0
県計	18	2	0	1	1	0	0	0

7. マメシンクイガ
つがる市森田中田、十和田市赤沼とも8月4半旬から誘殺が確認された。
いずれも誘殺数は平年並～少なく推移している。

性フェロモントラップにおけるマメシンクイガの誘殺推移

設置場所	月	7月						8月						9月					
	半旬	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
つがる市 （森田中田）	2026				0	0	0	0	0	0	14	29	66	66	62				
	2025				0	0	0	0	0	12	20	3	13	36	39	0	0	0	0
	平年			0	0	0	0	0	1	4	8	22	62	68	63	43	23	1	0
十和田市 （赤沼）	2026				0	0	0	0	0	0	12	6	1	1	0				
	2025				0	0	0	1	1	10	10	0	1	5	1	2	2	1	0
	平年			0	0	0	0	4	18	11	22	23	25	9	4	0	0	0	0



《当情報に関する問い合わせ先》
〒030-0113 青森市第二問屋町4-11-6
TEL:017-729-1717 FAX:017-729-1900 担当：横山