

## 令和 8 年度 水稻病害虫発生情報 第 5 号 ( 9 月上旬 )

### 1 穂いもち（発生量：少ない） 巡回調査では確認されなかった。

表 1 9 月上旬巡回調査における穂いもちの発生状況

| 地域 | 年次 | 調査<br>地点数 | 程度別発生地点率（％） |        |        |       |      | 発生地点<br>率（％） | 発病穂率<br>（％） |
|----|----|-----------|-------------|--------|--------|-------|------|--------------|-------------|
|    |    |           | 甚(>60)      | 多(>30) | 中(>10) | 少(>0) | 無    |              |             |
| 津軽 | 本年 | 24        | 0           | 0      | 0      | 0     | 100  | 0            | 0           |
|    | 前年 | 25        | 0           | 0      | 0      | 0     | 100  | 0            | 0           |
|    | 平年 | 33        | 0           | 0      | 0      | 10.2  | 89.8 | 10.2         | 0.03        |
| 県南 | 本年 | 15        | 0           | 0      | 0      | 0     | 100  | 0            | 0           |
|    | 前年 | 15        | 0           | 0      | 0      | 0     | 100  | 0            | 0           |
|    | 平年 | 25        | 0           | 0      | 0      | 7.2   | 92.8 | 7.2          | 0.07        |
| 県計 | 本年 | 39        | 0           | 0      | 0      | 0     | 100  | 0            | 0           |
|    | 前年 | 40        | 0           | 0      | 0      | 0     | 100  | 0            | 0           |
|    | 平年 | 58        | 0           | 0      | 0      | 8.9   | 91.1 | 8.9          | 0.05        |

### 2 紋枯病（発生量：やや多い） 発生地点率は平年より低かった。 発病度は津軽地域で平年並、県南地域で平年より高かった。

表 2 9 月上旬巡回調査における紋枯病の発生状況

| 地域 | 年次 | 調査<br>地点数 | 程度別発生地点率（％） |        |        |       |      | 発生地点<br>率（％） | 発病度  |
|----|----|-----------|-------------|--------|--------|-------|------|--------------|------|
|    |    |           | 甚(>70)      | 多(>40) | 中(>20) | 少(>0) | 無    |              |      |
| 津軽 | 本年 | 24        | 0           | 0      | 8.3    | 50.0  | 41.7 | 58.3         | 7.0  |
|    | 前年 | 25        | 0           | 0      | 0      | 44.0  | 56.0 | 44.0         | 2.0  |
|    | 平年 | 33        | 0           | 0.4    | 8.4    | 66.1  | 25.1 | 74.9         | 6.7  |
| 県南 | 本年 | 15        | 0           | 0      | 20.0   | 46.7  | 33.3 | 66.7         | 10.7 |
|    | 前年 | 15        | 0           | 0      | 13.3   | 46.7  | 40.0 | 60.0         | 6.5  |
|    | 平年 | 25        | 0           | 1.6    | 14.3   | 62.9  | 21.1 | 78.9         | 9.1  |
| 県計 | 本年 | 39        | 0           | 0      | 12.8   | 48.7  | 38.5 | 61.5         | 8.4  |
|    | 前年 | 40        | 0           | 0      | 5.0    | 45.0  | 50.0 | 50.0         | 3.7  |
|    | 平年 | 58        | 0           | 1.0    | 11.0   | 64.6  | 23.4 | 76.6         | 7.7  |

### 3 稲こうじ病（発生量：少ない） 発生地点率は津軽地域で平年より低く、県南地域で平年並であった。 発病株率は平年よりも低かった。

表 3 9 月上旬巡回調査における稲こうじ病の発生状況

| 地域 | 年次 | 調査<br>地点数 | 程度別発生地点率（％） |        |       |       |      | 発生地点<br>率（％） | 発病株率<br>（％） |
|----|----|-----------|-------------|--------|-------|-------|------|--------------|-------------|
|    |    |           | 甚(>30)      | 多(>15) | 中(>5) | 少(>0) | 無    |              |             |
| 津軽 | 本年 | 24        | 0           | 0      | 0     | 8.3   | 91.7 | 8.3          | 0.0         |
|    | 前年 | 25        | 0           | 0      | 0     | 0     | 100  | 0            | 0           |
|    | 平年 | 33        | 0           | 0.3    | 3.1   | 8.0   | 88.6 | 11.4         | 0.5         |
| 県南 | 本年 | 15        | 0           | 0      | 0     | 26.7  | 73.3 | 26.7         | 0.1         |
|    | 前年 | 15        | 0           | 0      | 0     | 0     | 100  | 0            | 0           |
|    | 平年 | 25        | 1.5         | 2.1    | 7.0   | 16.6  | 72.8 | 27.2         | 2.3         |
| 県計 | 本年 | 39        | 0           | 0      | 0     | 15.4  | 84.6 | 15.4         | 0.1         |
|    | 前年 | 40        | 0           | 0      | 0     | 0     | 100  | 0            | 0           |
|    | 平年 | 58        | 0.6         | 1.1    | 4.9   | 11.9  | 81.5 | 18.5         | 1.3         |

#### 4 フタオビコヤガ（発生量：少ない）

発生地点率、被害度ともに平年より低かった。

表4 9月上旬巡回調査におけるフタオビコヤガの被害状況

| 地域 | 年次 | 調査<br>地点数 | 程度別発生地点率（％） |        |        |       |      | 発生地点<br>率（％） | 被害度 |
|----|----|-----------|-------------|--------|--------|-------|------|--------------|-----|
|    |    |           | 甚（＞70）      | 多（＞40） | 中（＞20） | 少（＞0） | 無    |              |     |
| 津軽 | 本年 | 24        | 0           | 0      | 0      | 20.8  | 79.2 | 20.8         | 0.4 |
|    | 前年 | 25        | 0           | 0      | 0      | 8.0   | 92.0 | 8.0          | 0.1 |
|    | 平年 | 33        | 0           | 0      | 5.6    | 41.1  | 53.3 | 46.7         | 3.7 |
| 県南 | 本年 | 15        | 0           | 0      | 0      | 33.3  | 66.7 | 33.3         | 1.2 |
|    | 前年 | 15        | 0           | 0      | 0      | 6.7   | 93.3 | 6.7          | 0.1 |
|    | 平年 | 25        | 0           | 0.3    | 4.9    | 49.5  | 45.2 | 54.8         | 3.7 |
| 県計 | 本年 | 39        | 0           | 0      | 0      | 25.6  | 74.4 | 25.6         | 0.7 |
|    | 前年 | 40        | 0           | 0      | 0      | 7.5   | 92.5 | 7.5          | 0.1 |
|    | 平年 | 58        | 0           | 0.1    | 5.1    | 44.8  | 49.9 | 50.1         | 3.7 |

#### 5 コバネイナゴ（発生量：少ない）

発生地点率は津軽地域で平年より低く、県南地域でやや低かった。

被害度は津軽地域で平年より低く、県南地域で高かった。

表5 9月上旬巡回調査におけるコバネイナゴの被害状況

| 地域 | 年次 | 調査<br>地点数 | 程度別発生地点率（％） |        |        |       |      | 発生地点<br>率（％） | 被害度  |
|----|----|-----------|-------------|--------|--------|-------|------|--------------|------|
|    |    |           | 甚（＞70）      | 多（＞40） | 中（＞20） | 少（＞0） | 無    |              |      |
| 津軽 | 本年 | 24        | 0           | 0      | 41.7   | 25.0  | 33.3 | 66.7         | 12.1 |
|    | 前年 | 25        | 0           | 0      | 40.0   | 4.0   | 56.0 | 44.0         | 10.1 |
|    | 平年 | 33        | 0           | 0      | 47.7   | 44.6  | 7.7  | 92.3         | 16.4 |
| 県南 | 本年 | 15        | 0           | 0      | 13.3   | 40.0  | 46.7 | 53.3         | 5.7  |
|    | 前年 | 15        | 0           | 0      | 0      | 6.7   | 93.3 | 6.7          | 0.1  |
|    | 平年 | 25        | 0           | 0      | 3.7    | 57.3  | 39.0 | 61.0         | 3.2  |
| 県計 | 本年 | 39        | 0           | 0      | 30.8   | 30.8  | 38.5 | 61.5         | 9.6  |
|    | 前年 | 40        | 0           | 0      | 25.0   | 5.0   | 70.0 | 30.0         | 6.4  |
|    | 平年 | 58        | 0           | 0      | 29.0   | 49.8  | 21.2 | 78.8         | 10.8 |

#### 6 ウンカ類（発生量：少ない）

捕獲された種別はヒメトビウンカが主体で、発生地点率は平年より低く、株当たり捕獲数も平年より少なかった。

表6 9月上旬巡回調査におけるウンカ類の捕獲状況（10株払い落とし：幼虫含む）

| 地域 | 年次 | 調査<br>地点数 | 程度別発生地点率（％） |        |        |       |      | 発生地点<br>率（％） | 株当たり<br>頭数 |
|----|----|-----------|-------------|--------|--------|-------|------|--------------|------------|
|    |    |           | 甚（＞100）     | 多（＞50） | 中（＞10） | 少（＞0） | 無    |              |            |
| 津軽 | 本年 | 24        | 0           | 0      | 0      | 41.7  | 58.3 | 41.7         | 0.1        |
|    | 前年 | 25        | 0           | 0      | 0      | 64.0  | 36.0 | 64.0         | 0.2        |
|    | 平年 | 33        | 0           | 0      | 0.8    | 80.9  | 18.3 | 81.7         | 1.0        |
| 県南 | 本年 | 15        | 0           | 0      | 0      | 46.7  | 53.3 | 46.7         | 0.1        |
|    | 前年 | 15        | 0           | 0      | 0      | 46.7  | 53.3 | 46.7         | 0.2        |
|    | 平年 | 25        | 0           | 0      | 0      | 72.2  | 27.8 | 72.2         | 0.5        |
| 県計 | 本年 | 39        | 0           | 0      | 0      | 43.6  | 56.4 | 43.6         | 0.1        |
|    | 前年 | 40        | 0           | 0      | 0      | 57.5  | 42.5 | 57.5         | 0.2        |
|    | 平年 | 58        | 0           | 0      | 0.5    | 77.3  | 22.3 | 77.7         | 0.8        |

## 7 コブノメイガ（発生量：やや少ない）

巡回調査では確認されなかった。

表7 9月上旬巡回調査におけるコブノメイガの被害状況

| 地域 | 年次 | 調査<br>地点数 | 程度別発生地点率（％） |        |       |       |      | 発生地点<br>率（％） | 食害葉率<br>（％） |
|----|----|-----------|-------------|--------|-------|-------|------|--------------|-------------|
|    |    |           | 甚（＞45）      | 多（＞15） | 中（＞5） | 少（＞0） | 無    |              |             |
| 津軽 | 本年 | 24        | 0           | 0      | 0     | 0     | 100  | 0            | 0           |
|    | 前年 | 25        | 0           | 0      | 0     | 0     | 100  | 0            | 0           |
|    | 平年 | 33        | 0           | 0      | 1.4   | 9.1   | 89.5 | 10.5         | 0.17        |
| 県南 | 本年 | 15        | 0           | 0      | 0     | 0     | 100  | 0            | 0           |
|    | 前年 | 15        | 0           | 0      | 0     | 0     | 100  | 0            | 0           |
|    | 平年 | 25        | 0           | 0.4    | 0     | 8.4   | 91.3 | 8.7          | 0.14        |
| 県計 | 本年 | 39        | 0           | 0      | 0     | 0     | 100  | 0            | 0           |
|    | 前年 | 40        | 0           | 0      | 0     | 0     | 100  | 0            | 0           |
|    | 平年 | 58        | 0           | 0.2    | 0.8   | 8.9   | 90.2 | 9.8          | 0.15        |

## 8 イネカラバエ（発生量：少ない）

巡回調査では確認されなかった。

表8 9月上旬巡回調査におけるイネカラバエの被害状況

| 地域 | 年次 | 調査<br>地点数 | 程度別発生地点率（％） |        |        |       |      | 発生地点<br>率（％） | 被害穂率<br>（％） |
|----|----|-----------|-------------|--------|--------|-------|------|--------------|-------------|
|    |    |           | 甚（＞95）      | 多（＞65） | 中（＞30） | 少（＞0） | 無    |              |             |
| 津軽 | 本年 | 24        | 0           | 0      | 0      | 0     | 100  | 0            | 0           |
|    | 前年 | 25        | 0           | 0      | 0      | 4.0   | 96.0 | 4.0          | 0.03        |
|    | 平年 | 33        | 0           | 0      | 0      | 17.3  | 82.7 | 17.3         | 0.10        |
| 県南 | 本年 | 15        | 0           | 0      | 0      | 0     | 100  | 0            | 0           |
|    | 前年 | 15        | 0           | 0      | 0      | 0     | 100  | 0            | 0           |
|    | 平年 | 25        | 0           | 0      | 0      | 30.5  | 69.5 | 30.5         | 0.25        |
| 県計 | 本年 | 39        | 0           | 0      | 0      | 0     | 100  | 0            | 0           |
|    | 前年 | 40        | 0           | 0      | 0      | 2.5   | 97.5 | 2.5          | 0.02        |
|    | 平年 | 58        | 0           | 0      | 0      | 23.0  | 77.0 | 23.0         | 0.17        |

## 9 その他の病害虫

9月上旬巡回調査では、ニカメイガの被害が三八地域の1ほ場で被害が認められた。  
もみ枯細菌病、ごま葉枯病、白葉枯病、ツマグロヨコバイは確認されなかった。

### 【この情報に関する問合せ先】

〒030-0113 青森市第二問屋町 4-11-6

TEL:017-729-1717 FAX:017-729-1900 担当：主幹 菊池晴志