

令和8年度野菜害虫トラップ情報（9月下旬）

1 コナガ

性フェロモントラップによる誘殺数は、平年より少なく推移しているが、9月第3～4半旬は平年より多かった。




図1 性フェロモントラップにおけるコナガの半旬別誘殺推移

2 ヨトウガ

性フェロモントラップによる誘殺数は、9月第1～3半旬は平年より少なかったが、9月第4半旬から平年より多く推移している。




図2 性フェロモントラップにおけるヨトウガの半旬別誘殺推移

3 オオタバコガ

性フェロモントラップによる誘殺数は、9月は弘前市で平年より少なく、鯉ヶ沢町では9月第6半旬で多かった。おいらせ町では平年より少なく推移している。




図3 性フェロモントラップにおけるオオタバコガの半旬別誘殺推移

4 タマナギンウワバ

性フェロモントラップによる誘殺数は、平年より少なく推移している。




図4 性フェロモントラップにおけるタマナギンウワバの半旬別誘殺推移

5 カブラヤガ

性フェロモントラップによる誘殺数は、ほぼ平年並に推移している。




図5 性フェロモントラップにおけるカブラヤガの半旬別誘殺推移

6 タマナヤガ

性フェロモントラップによる誘殺数は、ほぼ平年並に推移している。




図6 性フェロモントラップにおけるタマナヤガの半旬別誘殺推移

7 ハスモンヨトウ

性フェロモントラップによる誘殺は、弘前市では8月第6半旬～9月第2半旬に平年より多く、おいらせ町では平年並から平年より少なく推移している。




図7 性フェロモントラップにおけるハスモンヨトウの半旬別誘殺推移

8 ナガイモコガ

性フェロモントラップによる誘殺数は、平年より少なく推移している。




図8 性フェロモントラップにおけるナガイモコガの半旬別誘殺推移

9 ネギコガ

性フェロモントラップによる誘殺数は、平年より少なく推移している。




図9 性フェロモントラップにおけるネギコガの半旬別誘殺推移

10 シロイチモジヨトウ

性フェロモントラップによる誘殺は、つがる市では9月第3半旬及び第6半旬に平年より多く、十和田市では9月第6半旬に平年より多かった。




図10 性フェロモントラップにおけるシロイチモジヨトウの半旬別誘殺推移

11 トマトキバガ

性フェロモントラップによる誘殺は、前年及び前々年より少なく推移している。




図11 性フェロモントラップにおけるトマトキバガの半旬別誘殺推移
※令和5年6月から調査、トラップはトマトハウス周辺に設置

表1 性フェロモントラップにおけるトマトキバガの誘殺数

設置場所	月	3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			誘殺数計
	半旬	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
弘前市	本年	-	0.2	4.8	9.3	10.3	1.4	3.4	5.0	1.2	1.3	2.0	1.0	7.0	7.0	23.0	31.2	26.8	58.8	150.1	165.1	228.6										738
	前年	-	-	-	-	-	2	4	8	2	4	16	6	23	20	48	82	73	217	211	318	307	366	655	668	411	309	315	100	46	106	4,317
	前々年	-	-	-	-	8	10	3	1	1	2	3	10	10	20	64	70	73	194	427	441	544	587	637	696	259	149	103	-	-	-	4,312
七戸町	本年	-	0	0	3.0	3.0	0	1.4	2.3	4.6	2.6	0.1	1.6	11.4	23.0	14.3	62.8	17.3	39.1	87.4	47.9	72.3										394
	前年	-	-	-	-	-	1	1	0	0.4	2	11	20	9	39	72	82	201	245	193	273	347	309	225	117	76	35	60	-	-	-	2,316
	前々年	-	-	-	-	0	0	0	0	0.2	1	7	6	14	18	37	36	25	48	61	101	119	175	151	170	107	86	103	-	-	-	1,265

※令和5年6月から調査、トラップはトマトハウス周辺に設置

表2 トマトハウス内での性フェロモントラップにおけるトマトキバガの誘殺数

設置場所	月	3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			誘殺数計
	半旬	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
弘前市	本年	1.0	0.2	2.4	5.4	1.7	1.1	4.3	4.3	4.9	3.7	5.1	6.1	9.0	21.1	87.9	70.0	85.0	188.2	217.7	252.9	258.7										1,231
	前年	-	-	-	4	6	4	3	1	2	8	13	16	20	36	97	172	156	345	808	1152	853	942	1257	655	318	204	202	63	19	35	7,391

※令和7年から調査

表3 (参考) 防除所敷地内での性フェロモントラップにおけるトマトキバガの誘殺数

設置場所	月	3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			誘殺数計
	半旬	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
青森市	本年	-	0	0	0	0	0	0	0	1.0	0	0	0	2.2	3.6	2.2	0	7.0	23.0	18.0	21.2	35.8										114
	前年	-	-	-	-	-	-	-	0	1	6	1	7	0	10	29	13	21	35	47	52	105	288	143	14	24	8	8	1	0	0	811
	前々年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	2	9	25	15	14	27	34	40	61	84	112	50	84	25	40	11	-	-	-	634

※令和6年から調査

【この情報に関する問合せ先】

担当 総括主幹 鈴木 千秋

030-0113 青森市第二問屋町4-11-6

TEL:017-729-1717 FAX:017-729-1900